



**Lic. Medicina veterinaria y zootecnia**

**Nombre de alumno: Axel Josafat  
morales juarez**

**Nombre del tema: RESUMEN**

**Nombre del profesor: Hugo Alexander**

**Cuatrimestre: 8°**

**Grupo: "A"**

La Cesárea en Bovinos es el método de elección para obtener un ternero vivo si la extracción forzada es imposible (Fubini y Ducharme, 2005). La principal indicación para realizarla son los partos distócico que son un riesgo tanto para la madre como para la cría La mayor preocupación se da cuando el feto se encuentra enfisematoso por el riesgo de contaminación peritoneal durante la cirugía, con un pobre pronóstico en comparación de un feto vivo o recientemente muerto, por lo que debemos informarle al cliente antes de realizar la operación.

El pronóstico mejora si la cesárea se realiza en posición de decúbito con acceso por línea media ventral o ventrolateral oblicua ya que se exterioriza y aísla el útero de la incisión antes de abrirlo (Momont,2005). Ambas técnicas reducen la contaminación del peritoneo que puede producirse cuando se retira un feto enfisematoso contaminado (Arthur y col., 1991). En este caso un agresivo tratamiento médico con fluido terapia, antiinflamatorio y antibiótico de amplio espectro es esencial para un resultado exitoso

Le puede interesar el ciclo de la vaca Solamente cuando las condiciones internas de la vaca son favorables, o sea, cuando no tiene hipertermia que indica ausencia o escasez de microorganismos en el contenido uterino, el feto está vivo y no se ha recurrido anteriormente a ninguna asistencia por personal no calificado puede esperarse un buen resultado de la operación cesárea

También debemos tener en cuenta la higiene y asepsia del acto quirúrgico, es importante esterilizar los instrumentos y paños, hacer una correcta limpieza de manos y una cuidadosa preparación del campo operatorio como ser, amplia tricotomía, lavado con agua tibia, jabón y detergente, con la posterior aplicación de antisépticos (clorhexidina y povidona iodada).