



Mi Universidad

Super notas

Nombre del Alumno: Ingrid Yosabet Anzueto Reyes

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Ginecología y Obstetricia

Nombre del profesor: MVZ.Hugo Alexander Perez Lopez

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: 8°

SINTOMAS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA PREÑEZ

Yeguas

Internos

La preñez puede ser observada como una estructura circular anecoica con una línea ecoica en el polo dorsal y ventral, a partir de los 9 a 10 días postovulación



1)

Externos

Los cambios en la ubre de la yegua serán vistos durante el último mes de embarazo. En las semanas antes de parir, la ubre se mantiene distendida durante todo el día, y sobre todo cuando los pezones se agrandan y comienzan a apuntar ligeramente hacia los lados en vez de hacia abajo, es que el momento se está acercando



2)

Porcinos

Internos

Si no muestra signos de estar en celo después de tres semanas de cubierta es que está preñada.



3)

Externos

- inapetencia al inicio
- Aumento de volumen en el abdomen
- Aumento de peso
- Desarrollo de glándulas mamarias



4)

Caninos y felinos

internos

-por medio de ultrasonido, se puede observar el feto en desarrollo y movimiento fetal



5)

Externos

- Aumento de peso
- abdomen con volumen
- aumento de tamaño en glandulas mamarias
- inapetencia
- mayor tiempo echadas



6)