



Mi Universidad

Súper nota

Nombre del Alumno: Aimer Leandro Aguilar García

Nombre del tema: Signos de la preñez

Parcial: II

Nombre de la Materia: Ginecología y obstetricia

Nombre del profesor: Hugo Alexander Pérez López

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: 8

SIGNOS INTERNOS Y EXTERNOS

Ginecología y obstetricia



EQUINOS

Las yeguas comienzan a presentar ciertos síntomas característicos como son la aparición de edema en la parte inferior del abdomen y el aumento de tamaño de las mamas. Estos signos son mucho más evidentes las 2 semanas antes del parto.



INTERNOS

- Aumento de la progesterona.
- Aumento del diámetro del cuerno.
- Adelgazamiento de la pared uterina.
- Sensación fluida acuosa dentro del cuerno.

EXTERNOS

- Aumento del tamaño de las glándulas mamarias.
- Aparición de edema en la parte inferior del abdomen.
- Parece inquieta, agitada.
- Se aparta del grupo.

PORCINOS

Si la cerda no muestra signos de estar en celo después de tres semanas de cubierta es que está preñada. La gestación dura 3 meses, 3 semanas y 3 días.

INTERNOS

EXTERNOS

- Aumento del tamaño de las glándulas mamarias.
- Aparición de edema en la parte inferior del abdomen.
- Parece inquieta, agitada.
- Ligamentos pelvianos se relajan



CANINOS

Si nuestra perra se queda embarazada, ya sea por un descuido nuestro o de forma premeditada, lo notaremos por las siguientes señales: Secreciones de flujo vaginal hasta un mes después del apareamiento. Las mamas y pezones crecerán y cambiarán a un color rosado.



INTERNOS

EXTERNOS

- Aumento de la progesterona.
- Aumento del diámetro del cuerno.
- Micción mas frecuente.
- Sensación fluida acuosa dentro del cuerno.

- Aumento del tamaño de las glándulas mamarias.
- Aparición de edema en la parte inferior del abdomen.
- Parece inquieta, agitada.
- Ligamentos pelvianos se relajan

FELINOS

El período de gestación de una gata puede variar desde un mínimo de 61 días hasta un máximo de 72 días. Es probable que tu gata no muestre ningún síntoma físico de gestación hasta pocas semanas antes del parto.



INTERNOS

- Aumento de la progesterona.
- Aumento del diámetro del cuerno.
- Micción mas frecuente
- Sensación fluida acuosa dentro del cuerno.

EXTERNOS

- Aumento del tamaño de las glándulas mamarias.
- Aparición de edema en la parte inferior del abdomen.
- Parece inquieta, agitada.
- Aumento del peso
- Maullidos frecuentes