



Mi Universidad

Súper Nota

Nombre del Alumno: Yaritza Hernández

Nombre del tema: Signos internos y externos de la preñez

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Ginecología y obstetricia

Nombre del profesor: Hugo Alexander Pérez López

Nombre de la Licenciatura: Medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre: 8

SIGNOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA PREÑEZ



EQUINOS

Externos:

- En la preñez avanzada el abdomen de los vacunos tiende a aumentar de tamaño
- Aumento del peso corporal
- Las ubres comienzan a aumentar de tamaño y a desarrollarse a los 4 -5 meses de gx
- Se observa un acentuado hundimiento de la grupa

Internos:

- Palpación del cuerno agrandado que contiene líquidos placentarios desde los 30 a los 90 días de gx
- Peloteo del feto en el útero agrandado que contiene membranas fetales y líquidos placentarios.
- Palpación de los placentomas


PORCINOS

Externos:

- Si la cerda no muestra signos de estar en celo después de tres semanas de cubierta es que está preñada.
- Aumentan de peso
- Ubres inflamadas

Internos:

- Los estrógenos, la oxitocina y la prolactina son hormonas clave que actúan e interactúan para preparar el cuerpo de la cerda



CANINO

Externos:

- Aumento de peso
- A partir del día 25 - 30 se pueden observar las ubres más hinchadas
- Náuseas matutinas durante la 3ª - 4ª semana.
- Los pezones se vuelven de un color más intenso
- Frecuentes cambios en el flujo vaginal(color blancas o transparentes)

Internos:

- Tienen concentraciones más elevadas de relaxina durante la gestación



FELINO

Externos:

- Pérdida de apetito
- Duerme durante más horas
- Se muestra más arisca
- Los pezones se inflaman
- Vientre abultado

Internos:

- Cambios hormonales

