



Lic. Medicina veterinaria y zootecnia

Nombre de alumno: Andrik Edelvani
Villatoro Ayala

Nombre del profesor: Hugo Pérez López

Materia: Producción de carne

Cuatrimestre: 8^o

Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas, enero
2024

Sistemas de pastoreo



Pastoreo rotacional voisin

Es un sistema de pastoreo, en el que no solo se busca satisfacer plenamente las necesidades del animal sino también la del pasto, con el objetivo de tener el mayor rendimiento de ambos y donde quien asuma el control de todo el sistema sea el hombre y así poder cambiar de sitio al animal para que coseche el forraje.

Pastoreo continuo


Este sistema no fue desarrollado ni inventado por nadie, es conocido como el pastoreo de épocas primitivas, en donde todo el planeta era un solo potrero. Luego, en la medida que las civilizaciones se fueron desarrollando y las tierras se repartieron, las fincas ganaderas quedaron como un solo potrero.

Pastoreo alterno

Este sistema consiste en hacer la división de un área en dos potreros de similares dimensiones, además una vez realizado esto, los animales pastorean en un potrero, mientras el otro potrero está descansando. En este sistema los potreros se utilizaran de manera alternada lo que permitirá su recuperación y un mejor aprovechamiento del crecimiento de los pastos.

Pastoreo en franjas

Consiste en asignar a los animales diariamente o por periodos menores de un día, mediante el uso de una cerca eléctrica, franjas de potrero suficiente para la alimentación del grupo de animales.



Pastoreo rotacional

En este sistema los animales pasan de un potrero a otro con el objetivo de hacer un eficiente uso de toda la pastura. Además el ganado las aprovechara de forma rotacional por cortos períodos tiempo lo que asegura el periodo de recuperación de la pastura.

Pastoreo estacional

También conocido como heno en pie, se basa en utilizar un área dedicada al pastoreo como reserva de alimento para ofertarlo a los animales en la época de mayor escasez; esto se logra dejando uno o dos o más potreros sin pastar con un descanso prolongado (2 – 6 meses).

Pastoreo a la estaca

Es utilizado en su mayoría por pequeños ganaderos y consiste en suministrar el pasto a los animales que están amarrados con una cuerda sujeta a una estaca, la cual se mueve dependiendo del animal, su requerimiento y la voluntad del productor. El área de pasto a consumir es determinado por el radio de la cuerda por lo que el desperdicio y despilfarro de las pasturas es mínimo. La principal desventaja radica en que necesita mucha vigilancia para movilizar al animal.




Razas de ganado de carne

Raza Hereford

Hereford es una de las razas productoras de carne más importantes del mundo

El color dominante es el rojo cereza al rojo abayado. Su cara es blanca, extendiéndose el blanco al pecho, vientre, ingle y extremidades, desde garrón y rodilla hacia abajo. El pecho y la cola es blanco, y las mucosas son rosadas.



Raza charolais

es un animal potente y de gran tamaño, el cual posee una frente ancha y corta, ligeramente hundida; finas orejas de tamaño mediano; morro ancho y labios gruesos, las membranas mucosas son de color rosado o carne; posee ojos grandes; cuernos de mediana longitud de color amarillento o blanco; morrillo corto y grueso en la parte superior del arranque del tórax; papada mediana, mostrando perfil amplio y no oscilante.



Raza Nelore

En zonas tropicales se ha obtenido el mayor perfeccionamiento de la raza con buenos tipos de animales productores de carne. Por lo que respecta a los pesos al nacer, se reportan 30 kg para los machos y 25 kg para las hembras.

A los 2 años, bajo buen régimen, pueden alcanzar los 400 kg. Los adultos pueden llegar a 800 kg (machos) y, las hembras, de 500 a 600 kg.



Raza angus

Optimo biotipo de raza productora de carne, es un animal voluminoso, no muy largo y de tamaño moderado. Ancho (especialmente en las regiones posteriores a la mitad del dorso) y de buena profundidad, cuenta con contornos redondeados y musculosos.

Posee garganta sin papada, y en general no acumula grasas debajo de la piel. Sus patas son bien aplomadas y separadas, con huesos sólidos; y sus brazos, fuertes y anchos. Puede tener pelaje negro o colorado, dependiendo de la variedad;

