Nombre de alumno: Marcelino Abraham Molina Gallegos

Nombre del profesor: Lic. Miguel Ángel Lopez Lopez

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico.

Materia: Patología del niño y adolescente

Grado: 5°

Grupo: Enfermeria

Ocosingo, Chiapas Marzo de 2024

Unidad 1

Tos Ferina

- Epidemiología
  - Agente etiológico: Bordetella pertussis
  - Infección
    - Afecta a cualquier grupo de edad
      - Neonatos
      - Lactantes
      - → Casos graves y mortales
    - Se ubica en el entorno doméstico
  - Transmisión: Contacto con secreciones respiratorias
- Clínica
  - Enfermedad: bulgeria
  - Tres fases consecutivas
    - Fase catarral
      - Periodo de incubación: 10 días (rango 5-21)
      - Síntomas leves
        - Rinorrea
        - Tos
        - Febrícula
        - Congestión nasal
        - → Dura 2 semanas
    - Fase paroxística
      - Dura 4 y 8 semanas
      - Predominio nocturno
        - Congestión o cianosis facial
        - vómitos
        - Sensación de ahogo
        - Gallo
          - Inspiratorio tras los golpes de tos
            - 5 o más golpes
    - Fase de convalecencia: Dura 2-4 semanas
- Diagnóstico
  - Sencillo en lactantes y niños no vacunados
  - Cuadro de tos típica
    - Congestión
    - Gallo
    - Predominio nocturno
  - Diagnóstico de laboratorio: Muestra de moco nasofaríngeo
- Tratamiento
  - Salbutamol
  - Corticoides inhalados
  - La vacunación

Difteria

- Enfermedad Infecciosa (Bacteriana): Corynebacterium diphtheriae
  - Afecta a las vías respiratorias
- Características: Falsas membranas (pseudomembranas)
  - En la garganta (faringe): Toxina (bacteria)
- Contagio
  - Directo: Gotitas respiratorias que eliminan al toser
  - Indirecto: Objetos contaminados
- Periodo de incubación: 2 a 5 días
- Presentación
  - Difteria respiratoria
    - Síntomas
      - Dolor de garganta
      - Malestar general
      - Dificultad al tragar
      - Pérdida de apetito
      - Faringe enrojecida
        - 2 a 3 días placas grisáceas y blanquecinas
          - Falsas membranas (pseudomembranas)
  - Difteria cutánea
    - Lesión en la piel
      - Herida
      - eczema
      - psoriasis
- Diagnóstico
  - Sintomatología
  - Cultivo de la bacteria
    - Muestras de la faringe o de la nariz
- Tratamiento
  - Hospitalización para controlar la respuesta al tratamiento
  - Antitoxina diférica
    - Neutralizar la toxina producida por la bacteria
  - Antibióticos
    - Eliminar el Corynebacterium diphtheriae
- Prevención
  - La vacunación
    - Combinada con la del tétanos y la de la tos ferina
      - DTPa

Tétanos

- Enfermedad aguda y grave
- El microorganismo causante
  - Clostridium tétanii
    - Esporoinas (tetanolisina y tetanospasmina)
      - Bloqueo de la función neurotransmisora
        - Contracción de los músculos
    - frecuente en la naturaleza
    - No existe transmisión persona a persona
- Periodo de incubación
  - 3 a 21 días, usualmente 8 días
    - Entre más alejada la herida del sistema nervioso centro
      - Mayor es el periodo de incubación
- Síntomas
  - Espasmos leves en los músculos de la mandíbula (trismo)
    - Afectación
      - Toraxs
      - Cuello
      - Espalda
      - Músculos abdominales
  - Otros síntomas
    - Babeo
    - Sudoración excesiva
    - Fiebre
    - Espasmos de la mano o del pie
    - Irritabilidad
    - Dificultad para deglutir
- Tratamiento
  - Antibióticos
  - Reposo en cama en un ambiente calmado (luz tenue, poco ruido y temperatura estable)
  - Medicamentos para neutralizar el tóxico (inmunoglobulina antitetánica)
  - Relajantes musculares (diazepam)
  - Sedantes

Poliomielitis

- Enfermedad infecciosa viral
  - Caracterizada por una parálisis flácida asimétrica
- Tres serotipos del virus de la poliomielitis
- Periodo de incubación
  - 4-24 días en el niño vacunado
  - 11-58 días en los contactos
  - Hasta 8 meses en los inmunodeprimidos
- Virus
  - Afecta la uno faringe
    - Se replica en el tracto intestinal
  - Invade los ganglios linfáticos
    - produciendo la primera viremia
- Clínica
  - Dos formas de enfermedad
    - Mayor
    - Menor
      - poliomielitis abortiva
        - Síntomas
          - Fiebre
          - Vomito
          - Diarrea
          - Cefalea
      - poliomielitis paralítica
        - Fiebre elevada
        - Cefalea intensa
        - Dolor en la región lumbar
      - poliomielitis no paralítica
        - Parálisis flácida asimétrica del tronco y extremidades
- Síntomas
  - Mayormente asintomáticos
    - 1 de cada 4 personas
      - Dolor de garganta Fiebre
      - Cansancio Náuseas
      - Dolor de cabeza
      - Dolor de estómago
  - Parálisis extremidades inferiores y superiores
    - Síntomas más grave de la poliomielitis

Escarlatina

- enfermedad exantemática
  - Infecciocontagiosa
- Transmisión
  - persona a persona
    - Estornudar
    - toser
- Bacteria
  - Estreptococo beta hemolítico
    - Produce hemólisis de los eritrocitos
      - 80 serotipos
- Factores de riesgo
  - Frecuente en zonas urbanas
  - Se presenta en hombres y mujeres por igual
  - En México es más frecuente en invierno
  - Al inicio en brusco
  - Fiebre mayor de 39.5°C
    - 2 y 4 días
  - Odinofagia
  - Cefalea
  - Nausea
  - Vomito
  - Dolor abdominal
  - Mialgias
  - Malestar general
  - Faringe congestiva
- Signos y síntomas

Sarampión

- Enfermedad viral
  - Paramixovirus
  - Contagiosa y grave
    - Infecta el tracto respiratorio
      - Extiende al resto del organismo
- Transmisión
  - Contacto directo y del aire
- Manifestaciones clínicas
  - El primer signo suele ser la fiebre alta
    - 10 a 12 días después de la exposición al virus
      - dura 4 y 7 días
  - Fase inicial
    - Inorrea
    - Tos
    - Ojos llorosos y rojos
    - Manchas blancas en la cara de las mejillas
    - Aparece un exantema
      - Dura 5 a 6 días
  - Muerte
  - Complicaciones
    - Menores de 5 años y adultos de más de 30 años
    - Ceguera
    - Encefalitis
    - Diarrea grave
- Transmisión
  - Contagioso
    - Tos
    - Estornudos
    - Contacto íntimo
    - Contacto directo con secreciones nasales
- Tratamiento
  - Ningún tratamiento antiviral
  - Apoyo que garantice una buena nutrición
  - Suficiente de líquidos
- Prevención
  - La vacunación sistemática de los niños

Varicela

- Herpes zoster
- Enfermedad viral
  - VVZ
- Enfermedad benigna
  - Propia de la infancia
- Caracterizada
  - Maculo-vesicula-costroso generalizado
    - Con fiebre
- Periodo de incubación
  - 14 a 16 días (intervalo de 7 a 21 días)
- marzo-mayo
  - Pico estacional
- Transmisión
  - Persona a persona
    - Contacto directo con las vesículas cutáneas que contienen el virus
  - Intrauterina del virus por infección aguda
- Periodo de contagio
  - 1-3 días antes de la aparición del exantema
- Complicaciones
  - Cutáneas
  - Neurológicas
  - Respiratorias
  - Hematológicas
- Diagnóstico
  - Clínico
    - Casos atípicos
    - Pacientes inmunodeprimidos
      - recurrir al laboratorio

Tuberculosis

- Enfermedad bacteriana
  - Mycobacterium tuberculosis (MT)
  - Requiere el aislamiento y cultivo
- Síntomas
  - Pérdida de peso
  - Sudoración nocturna
  - Astenia
  - Anorexia
  - Fiebre en evolución
- Tratamiento
  - Asociar varios fármacos para prevenir la aparición de resistencias
- Complicaciones
  - Disnea
  - Hipoxemia
  - Hemoptisis
  - Bronquiectasia

Meningitis

- Proceso inflamatorio agudo
  - Nervioso central
    - Microorganismos que afectan las leptomeninge
- Bacteria frecuente
  - Periodo neonatal
    - Streptococcus agalactiae
- Manifestación clínicas
  - Diferentes según la edad
    - Recién nacido
      - Fiebre
      - Irritabilidad
      - Rechazo de tomas
      - Vomito
    - Lactante
      - Fiebre
      - Irritabilidad
      - Rechazo de tomas
      - Vomito
      - Decaimiento
      - Convulsiones

Hepatitis

- Enfermedad infecciosa del Hígado
- Causada por distintos virus (hepatitis A, B, etc)
- Caracterizado por necrosis hepatocelular e inflamación
- Se divide
  - Hepatitis infecciosa
    - Causada por el virus de la hepatitis A
  - Hepatitis sérica
    - Causada por el virus de la hepatitis B
- Síntomas
  - Cansancio y debilidad
  - Pérdida de apetito
  - Orina oscura
  - Color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos (ictericia)
- Hepatitis aguda
  - Hace referencia temporal de una inflamación aguda
  - Variedad de etiologías
    - Tóxicas
    - Farmacológicas
    - Autoinmunes
    - Bacterianas
    - Virales
- Estadios
  - Periodo de incubación
  - Fase pre ictérica
  - Fase ictérica
  - periodo de convalecencia

VIH/ S.I.D.A

- Virus de inmunodeficiencia humana
- El infectado
  - Afectación del sistema inmune
- Transmisión
  - Persona a otra a través de ciertos fluidos corporales
    - Sangre
    - Semen y líquido pre seminal
    - Fluidos rectales
    - Fluidos vaginales
    - Leche materna
    - Inyección en el torrente sanguíneo
- Signos y síntomas
  - Fiebre
  - Dolor de cabeza
  - Erupción cutánea
  - Dolor de garganta
  - Infección debilita progresivamente
    - Inflamación de los ganglios linfáticos
    - Pérdida de peso
    - Fiebre
    - Diarrea
    - Tos
- Sin tratamiento
  - Enfermedades graves
    - Tuberculosis
    - Meningitis por criptococos
    - Infecciones bacterianas graves

Atención de enfermería a pacientes con enfermedades infecto-Transmisible

- Higiene de manos
  - Lavarse las manos regularmente
    - Evitar propagación de bacterias
    - Manos siempre limpias
- Aislamiento
  - Separación de un individuo que padece una enfermedad transmisible
    - Los diferentes tipos de aislamiento
      - Finalidad
        - Disminución del riesgo de infección
        - Disminución de la incidencia de infecciones nosocomiales
        - Poder prestar una alta calidad de atención
- CUIDADOS COMUNES/GENERALES A TODAS LAS ENFERMEDADES
  - Extremar medidas higiénicas sobre todo lavado exhaustivo y constante de manos
  - Desinfección del aula y juguetes que puedan estar contaminados
  - Informar al profesionaly personal del centro dotas correctas actuaciones ante la detecciónde una enfermedad infecto contagiosa
  - No compartir objetos de uso individual (vasos, cuiaeiles, pañuelos, toallas, ¿ S. Aureus? Y otros objetos potencialmente contaminado (papel, pañuelos, pañales,)

Presented with xmind

Unidad II

Aparato digestivo

Aparato digestivo

- Tracto digestivo
- Órganos huecos
  - Largo y tortuoso tubo que va de la boca al ano
- Otros órganos
  - transformar y absorber los alimentos
- Formado
  - Órganos
    - Boca
    - Esófago
    - Estómago
    - Intestino delgado
    - Intestino grueso
      - Colon
      - Recto
      - Ano
  - Órganos accesorios
    - Hígado
    - Páncreas
    - Producen jugos
- Mezcla de alimentos
  - Tracto digestivo
  - Descomposición química
  - Comienza
    - Boca
  - Termina
    - Intestino delgado
  - Cuatro etapas
    - La ingestión de los alimentos por la boca
    - La digestión de los alimentos en el tubo digestivo
    - La absorción de los nutrientes a la sangre
    - La egestión de los desechos a través del ano
  - Clándulas que producen jugos
  - Saliva
    - Contiene enzimas

Infecciones gastrointestinales, complicaciones y tratamiento

- Infecciones víricas
- Bacterianas
- Parasitarias
  - Causan gastroenteritis ← Inflamación del tubo digestivo ← Síntomas
    - Diarrea
    - Vomito
    - Dolor abdominal
- Infecciones gastrointestinales
  - Gran número de microorganismos
- Adenovirus
  - Causa
    - diarrea
    - fiebre
    - conjuntivitis
    - cistitis
    - erupciones cutáneas
- Campylobacter
  - Bacterianas más comunes
  - infección más común en niños
  - Provoca
    - Diarrea
    - Cólicos
    - Vómitos
    - Fiebre
  - Transmisión
    - Ingestión de carne
- Clostridium difficile
  - Casos de diarrea
    - 25%
    - Contraída en hospitales
    - Contraída en centros de atención
- Escherichia coli
  - E. coli
    - Causa principal de la diarrea del viajero
      - Ingestión de agua contaminada
        - Heces humanas o animales
- Helicobacter pylori
  - H pylori
    - Causa gastritis
    - Ulceras gástricas y duodenales
    - Dolor estomacal o náuseas
    - Personas infectadas
      - Riesgo de 10 % al 20 % de desarrollar úlceras pépticas
      - 1 % al 2 % de cáncer de estómago
- Rotavirus
  - Frecuente de diarrea en niños pequeños
    - Casos graves
- Salmonella y Shigella
  - Enfermedades gastrointestinales
  - Transmitidas por los alimentos
  - Se encuentran en carnes crudas
  - Síntomas
    - Náuseas
    - Vómitos
    - Cólicos
    - Diarrea
    - Fiebre
- Staphylococcus aureus
  - Intoxicación alimentaria
  - Síntomas
    - Fuertes náuseas
    - Dolor cólico
    - Diarrea
    - Dura de 1 a 2 día
  - Transmisión
    - Alimentos
- Yersinia enterocolítica
  - Y. enterocolítica
    - Diarrea y dolor abdominal
    - Se adquiere
      - Yersinia principal 1

Aparato respiratorio

Atención de enfermería en las infecciones gastrointestinales

- Inflamación
  - Membrana interna
    - Causada por un virus
      - Bacteria
      - Pediatrics
- enfermedad más común en los Estados Unidos
  - Infección
    - Norovirus
- Síntomas
  - Diarrea
  - Dolor abdominal
  - Vomito
  - Dolor de cabeza
- Problema común
  - Deshidratación
- Cuidados de enfermería
  - El manejo de los casos de diarrea consta de cinco pasos
    - Evaluar determinar el estado de deshidratación y la presencia de otros problemas complicaciones asociadas a la diarrea
    - Rehidratar al paciente por vía oral o intravenosa y monitorizarlo
    - Mantener al paciente hidratado, administrando bebidas con solución de rehidratación oral
    - Administrar un antibiótico u otros tratamientos cuando exista indicación expresa
    - Manejo de la diarrea en el hogar que incluya educación en prevención, información sobre rehidratación oral, alimentación
- Diagnósticos enfermeros
  - Proporcionar seguridad
    - Facilitar la intimidad adecuada para la eliminación
    - Responder rápidamente a las solicitudes de ayuda para la eliminación

Aparato respiratorio

- Órganos diferentes funciones
- Conata
  - Sistema de conducción
  - Sistema de intercambio
  - Las vías nasales se confirman
    - Células sensitivas
    - Nervio olfativo
    - Pituitaria
    - Cornetes
    - Fosas nasales
- Intercambio gaseoso
  - Termorregulación y humectación del aire inspirado
  - Elaboración y secreción de IgA
  - Participa en la fonación

Infecciones respiratorias agudas

- IRA
  - Afecta
    - Oídos
    - Nariz
    - Garganta
  - Dos tipos de infección
    - Infecciones de las vías respiratorias superiores
    - Infecciones de las vías respiratorias inferiores
  - Factores de riesgo
    - Bajo peso al nacer
    - Lactancia materna ineficaz
    - Hacinamiento
    - Exposición a humo
    - Desnutrición
  - Signos de alarma en infantes
    - Aumento en la frecuencia respiratoria o respiración rápida
    - Se le hunden las costillas al respirar
    - Presenta ruidos extraños al respirar o "le silba el pecho
    - No quiere comer o beber y vomita todo
    - Fiebre, que no cede con la administración de medicamentos
    - Decaimiento y somnolencia
    - Ataques o convulsiones
  - En escolares, adolescentes y adultos
    - Aufoxia o dificultad para respirar (o incluso sensación de dificultad para respirar)
    - Dolor en el pecho al respirar y toser
    - Decaimiento o cansancio excesivo
    - Fiebre mayor de 38,5 grados centígrados, durante más de dos días

Bronconeumonías

- Inflamación
  - Parte baja de las vías respiratorias
- Producida por microbios (virus y bacterias)
- Trastornos pulmonares y respiratorios
- Causa de muerte infantil
- Síntomas
  - Fiebre
    - Más de 3 días
  - FR agitada 40-60 rpm
  - Hundimiento de costillas
  - Escalofríos
  - Taquicardia
  - Estertores respiratorios
- Respiración bronquial
  - Tos con esputo purulento y sanguinolento
  - Dolor torácico intenso
  - Distensión abdominal
- Prevención
  - Control periódico de la salud
  - Plan de vacunas al día
  - Prevenir la desnutrición y disminuir la contaminación ambiental y domiciliaria
  - Evitar fumar
  - Evitar el contacto con la polución extra domiciliaria

Bronquitis aguda

- Inflamación de los bronquios
- Causa
  - Virus
  - Bacteria
- Duración
  - Días o semanas
- Síntomas
  - Esputo
  - Falta de aire
  - Sibilidos al respirar
- Diagnostico
  - Rx
    - Muestra hiperinflación
  - Muestra de esputo
  - Análisis de sangre
- Tratamiento
  - Antibióticos

Aparatos urinario

Atención de enfermería en pacientes con infecciones respiratorias

- DIAGNOSTICOS
  - Limpieza de vías aéreas
    - MIP ciancosis
      - Apnea
        - Exceso esputo
- OBJETIVOS
  - Permeabilidad de las vías aéreas
  - Prevención de la aspiración
  - Estado respiratorio de la ventilación
- INTERVENCIONES
  - Manejo de la vía aérea
  - Aspiración de la vía aérea
  - Cuidados en la emergencia
  - Vigilancia de la vía aérea
  - Prevención de la aspiración

Aparatos urinario

- Serie de órganos
  - Tubos
  - Músculos
  - Nervios
  - Producir, almacenar y transportar orina
- Conata
  - Dos riñones
    - Forma de frijol
    - Media espalda
    - Elimina urea
  - Dos uréteres
    - Viaja la orina
  - Vejiga
    - Se almacena
  - Dos esfínteres
    - Permite la expulsión de orina
  - Uretra
    - Expulsa la orina
- Absorbe nutrientes
- Elimina sangre
  - Urea

Infecciones de vías urinarias

- Mujeres más propensas
- Limita a la vejiga
  - Dolorosa y molesto
- Infección de la vejiga (cistitis)
  - Causado por
    - Escherichia coli
- Infección de la uretra (uretritis)
  - Bacterias propagadas
    - Infecciones de transmisión sexual
- Factores de riesgo
  - Anatomía femenina
  - Actividad sexual
  - Ciertos tipos de anticonceptivos
- Otros factores de riesgo de infección urinaria
  - Anormalidades en las vías urinarias
  - Obstrucciones en las vías urinarias
  - Sistema inmunitario deprimido
  - Procedimiento urinario reciente

Glomerulonefritis

- Inflamación
  - Pequeños filtros de los riñones
    - Glomérulos
- Signos y síntomas
  - Orina de color rose o amarronado hematuria
  - Orina espumosa debido al exceso de proteína (proteinuria)
  - Presión arterial alta (hipertensión)
  - Retención de líquidos (edema)
- Causas
  - Glomerulonefritis poseestreptocócica
  - Endocarditis bacteriana
  - Infecciones víricas
  - Lupus
  - Síndrome de Goodpasture
  - Nefropatía por inmunoglobulin
  - Poliarteritis
  - Granulomatosis con poliangitis
- Complicaciones
  - glomerulonefritis
    - Dañe riñones
      - Capacidad de filtrado
  - Insuficiencia renal aguda
  - Enfermedad renal crónica
  - Presión arterial alta
  - síndrome nefrótico

Síndrome nefrótico

- Trastorno renal
  - Demasiada proteína
- Causa edema
  - Piel
  - Tobillos
- Signos y síntomas
  - Hinchazón intensa (edema)
  - Orina espumosa
  - Aumento de peso debido a retención de líquidos excesiva
  - Fatiga
  - Pérdida de apetito Causas
- Enfermedades
  - Nefropatía de cambios mínimos
  - Glomerulosclerosis focal y segmentaria
  - Nefropatía membranosa
  - Lupus eritematoso sistémico
  - Amilo dosis
  - Coágulos sanguíneos en las venas de los riñones
- Factores de riesgo
  - Enfermedades que dañan los riñones
  - Determinados medicamentos
  - Determinadas infecciones
  - Coágulos sanguíneos
  - Mala nutrición
  - Presión arterial alta
  - Insuficiencia renal aguda
  - Enfermedad renal crónica
  - Infecciones

Atención de enfermería en pacientes con infecciones urinarias

- Infección varios puntos
  - Vejiga
  - Riñones
  - Uréteres
  - Uretra
- Cuidados de Enfermería
  - Plan de cuidados enfermeros
    - DX: Riesgo de deterioro de la integridad tisular (r) infección del tracto urinario
  - OBJETIVO
    - La persona no presentara deterioro tisular en el trabajo urinario
  - INTEVENCIONES DE ENFERMERÍA
    - Vigilar la eliminación urinaria, lo que incluye frecuencia, volumen, consistencia, color, con el fin de identificar posibles alteraciones
    - Explicar a la persona la necesidad de practicar pruebas diagnósticas para el seguimiento de la infección, tales como:
      - Cultivo de orina y antibiograma
      - Análisis de sangre
      - Tinción del sedimento de la orina
- Conclusión
  - Infección de orina
    - Enfermedad frecuente
      - Personal de enfermería debe estar perfectamente cualificado
        - Investigar el origen de la infección
          - Controlar la medicación
          - Transmitir al paciente medidas necesarias de higiene
            - Durante la infección
            - Evitar una recaída en el futuro

Presented with xmind