



Mi Universidad

Ensayo

Nombre del Alumno: Karla Hernández Yáñez

Nombre del tema: Ginecología


Parcial: Segunda Actividad

Nombre de la Materia: Ginecología y Obstetricia

Nombre del profesor: José Francisco Vázquez Vázquez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: Quinto B



GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

3.8. Enfermedad trombofoblastica gestacional.

ES
Grupo de trastornos que involucran el crecimiento anormal de las células trofoblasticas, que son las células que normalmente forman la placenta durante el embarazo.

Tipos de Enfermedad

Embarazo Molar:

Puede ser

COMPLETO

Ocurre cuando hay una fertilización anormal de un óvulo vacío (sin núcleo) por un espermatozoide. Esto resulta en una proliferación anormal de las células trofoblasticas.

PARCIAL

Ocurre cuando dos espermatozoides fertilizan un óvulo normal. Se produce un desarrollo anormal del embrión y una proliferación anormal de las células trofoblasticas.

Tumores Trofoblasticos Gestacionales:

-Coriocarcinoma
-Mola invasiva
-Tumor trofoblastico del sitio de implantación placentaria

Síntomas
 Sangrado vaginal anormal.
 Aumento del tamaño uterino fuera de proporción con la edad gestacional.
 Náuseas y vómitos graves.
 Niveles elevados de la hormona gonadotropina coriónica humana (hCG)

Diagnostico
-Ecografía:
-Análisis de hCG:
-Histología:

3.10. Infección de vías urinarias y embarazo.

Las IVU pueden afectar a cualquier parte del sistema urinario, incluyendo la vejiga (cistitis), los uréteres y los riñones (pielonefritis).

Síntomas

CISTIS
-Dolor o ardor al orinar.
-Urgencia y frecuencia urinaria.
-Orina turbia o maloliente.
-Malestar pélvico bajo.

Pielonefritis
Síntomas de cistitis, además de Dolor en la parte baja de la espalda o costado
Fiebre y escalofríos
Náuseas y vómitos

Complicaciones
-Parto prematuro
-Bajo peso al nacer
-Hipertensión gestacional

Tratamiento
-Antibióticos seguros en el embarazo a eliminar las bacterias.
-Reposo y cuidado adecuado.

Prevención
-Higiene Personal
-Orinar Regularmente
-Hidratación
-Evitar Irritantes:

3.11. Amenaza de parto prematuro. Ruptura prematura de membranas.

son
situaciones en las cuales existe el riesgo de que el parto ocurra antes de las 37 semanas de gestación, considerándose prematuro.

Amenaza de Parto Prematuro:

Se produce cuando una mujer embarazada presenta signos y síntomas que sugieren que podría dar a luz antes de término.

Síntomas:
-Contracciones uterinas regulares.
-Cambios cervicales, como dilatación o borramiento.
-Dolor abdominal persistente o cólicos.

Evaluación y Tratamiento
-Monitorización de las contracciones y cambios cervicales.
-Reposo y restricción de actividad
-Hidratación intravenosa.
-Administración de medicamentos tocolíticos para suprimir las contracciones.

Ruptura Prematura de Membranas

Ocurre cuando las membranas que rodean al feto se rompen antes de que comience el trabajo de parto.

Síntomas:
-Pérdida de líquido amniótico
-Posible contracción uterina después de la ruptura de membranas.

Evaluación y Tratamiento:
-Confirmación de la RPM a través de la evaluación clínica y pruebas específicas
-Monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal
-Administración de antibióticos para prevenir infecciones.
-Restricción de actividad y posiblemente hospitalización.

Consideraciones Generales:
-Ambas condiciones pueden ocurrir de manera simultánea.
-La evaluación y el tratamiento temprano son cruciales para minimizar el riesgo de complicaciones.

4.13. Métodos de planificación temporales y definitivos.

Métodos para la anticoncepción en función del mecanismo que utilizan para evitar el embarazo, así como su duración y habilidad.

MÉTODOS

Método del Ritmo o del Calendario
Método de la Temperatura Basal:

Naturales

Emergencia Postcoital:

-Píldora anticonceptiva de emergencia (PAE).
-Dispositivo intrauterino de emergencia (DIU de cobre).

Barrera

Condomes
Diafragma y Capuchón Cervical:

Hormonales

-Píldoras Anticonceptivas
-Parches y Anillos
-Inyecciones
-Dispositivos Intrauterinos

Permanentes

-Ligadura de Trompas (Mujeres)
-Esterilización: Vasectomía (Hombres):