


HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD:



Nombre: _____ Clase: _____

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA (NANDA)

Etiquetas (para el em. U. P):

Autocuidado

Factores relacionados (causas) (E)

- Dolor
- Debilidad

Características de los datos (signos y síntomas)

- Dificultad para llevarse comida a la boca.
- Dificultad para alimentarse casi mismo con una comida completa.
- Dificultad para manipular los alimentos en la boca.

RESULTADO (NCC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTAJE EN LA ESCALA
Autocuidado Comer.	• Coge tazas o vasos 030309	Gravemente 1. comprometido 2. Sustancialmente comprometido 3. Moderadamente comprometido 4. Levemente comprometido 5. No comprometido	• Mantener a: 3
Acciones personales para preparar e ingerir comida y líquidos independientemente con o sin dispositivo de ayuda.	• Coloca la comida en la boca. 030311		• Aumentar a: 1 • Mantener a: 4 • Aumentar a: 2

INTERVENCIONES (NIC):

ACTIVIDADES

INTERVENCIONES (NIC):

ACTIVIDADES

Intervenciones CNIC):

ACTIVIDADES

- 1- Colocar al paciente con una alineación corporal adecuada.
- 2- Colocar la lee de llamado al alcance de la mano.
- 3- Utilizar dispositivos en la cama que protejan al paciente.
- 4- Evitar utilizar ropa de cama con texturas ásperas.
- 5- Colocar al paciente sobre una cama o colchón terapéutico adecuado.

ACTIVIDADES

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA:

Dominio: Promoción de la Salud **Clase:** Manejo de la Salud

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA (NANDA)

Etiqueta (problema) (P):

Limitación en el movimiento

Factores relacionados (causas) (E):

- Dolor
- Rigidez en las articulaciones

Características definitorias (signos y síntomas)

- Marcha alterada
- Movimiento lento
- Dificultad para girar
- Disminución de la metrocidad.
- Disminución del movimiento

RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
Movilidad.	Marcha	1. Grávemente comprometido 2. Sustancialmente comprometido 3. Moderadamente comprometido 4. Levemente comprometido 5. No comprometido.	Mantener a: 3
Capacidad para moverse con resolución en el entorno independientemente con o sin mecanismo de ayuda.	- Movilidad		Aumentar a: 1
	020810		
	020804		Mantener a: 3
			Aumentar a: 1

INTERVENCIONES (NIC):

ACTIVIDADES

INTERVENCIONES (NIC):

ACTIVIDADES

PLACE:

Intervenciones CNICD:

ACTIVIDADES:

- Considerar la edad del paciente al promover las actividades de autocuidado.
- Comprobar la capacidad del paciente para ejercer las actividades independientes.
- Proporcionar un ambiente terapéutico garantizado una experiencia cálida, relajante, privada y personalizada.
- Ayudar al paciente a aceptar las necesidades de dependencia.
- Establecer una rutina de actividades de autocuidado.

ACTIVIDADES

CONCLUSION

En conclusión poliomielitis llega a hacer una enfermedad infecciosa altamente contagiosa(transmisible) a través de heces, o de boca a otro individuo , la polio empieza de una forma aguda con una parálisis flácida.

Está no llega a afectar o no se llega a detectar rápidamente ya que los síntomas en algunas personas no llegan a aparecer en los primeros días, pero hay personas que si, que llegan a tener, fiebre, fatiga, vómitos o dolores en algunas extremidades, generalmente en las partes inferiores.

Está en enfermedad como dimos a conocer, pueden llegar a afectar al cerebro y a eso llevar acabo la muerte, a todo esto existen vacunas, que pueden ayudar contra la poliomielitis a los niños menores de 5 años, ya que son los más susceptibles a contraer este virus, se estimaron las tasas de seto prevalencia de los distintos tipos de poliomielitis , de acuerdo con cada variable,Luego , se aplicó la prueba "Z" para contrastar las proporciones entre las prevalencias mayores y menores observadas en cada variable. Así también se llegaron a emplear los paquetes DEB III-plus para el manejo de los datos y SAS para las medidas de frecuencia.

La polio como dijimos, sus síntomas llegan hacer no visibles, llegan ser iguales a una gripe, como por ejemplo fiebre, dolor de garganta, náuseas, dolor de cabeza, cansancio o dolor de estómago, por lo general estos síntomas llegan a durar aproximadamente de 5 a 2 días y llegan a desaparecer por si solos, la parálisis de la médula espinal refiriéndonos a las partes inferiores y partes de en medio, llega a hacer el síntoma más grave de este virus puede provocar la discapacidad o generalmente la muerte del huésped.

La polio tiene tanto su tratamiento , y sus prevenciones, como tratamiento en general, a que lo debido es que no existe cura para la poliomielitis a todo esto, nos centramos a lo que es el aumento de bienestar, acelerar la recuperación y prevenir cualquier complicación que se llegue a dar, como tratamiento tiene que estar en reposo ya sea en una cama, analgésicos, compresas húmedas, ejercicios de fisioterapia para prevenir la pérdida de función muscular y férulas o algunos otros dispositivos para una buena alineación en la columna vertebral y en las extremidades. Y con su prevención la mejor

forma es mediante la vacunación. Esta vacunación más que totalmente dirigida a los niños menores de 5 años de edad. Ya que lo mejor es completar oportunamente el esquema de vacunación recomendado por las autoridades de salud de cada país. Para que un niño adquiera la inmunidad contra de la polio se requiere que reciba varias dosis de la vacuna de la poliomiélitis.



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Andres Eduardo Pinto Arizmendi

Nombre del tema: Place 2 avance

Parcial: 3 unidad

Nombre de la Materia: Submodulo II

Nombre del profesor: María José Hernández

Nombre de la Licenciatura: Técnico en enfermería

Semestre: 4rto Semestre de enfermería

BIBLIOGRAFIA

2021 NANDA International, Nueva York, NY10001.EE.UU Editorial: Elsevier

Autor: NANDA

2013 NOC Quinta edición, Barcelona España. Editorial: Elsevier. Autor: Dr.

Máximo A. Gonzales Jurado.

2013 NIC Sexta edición, Barcelona España, Editorial: Elsevier. Autor: DR.

Máximo A. Gonzales Jurado.