

## Cuestionario neuralgia del trigémino

1. ¿Cuál es la característica clínica principal de la neuralgia del trigémino?
  - a) Dolor sordo y constante en la mandíbula
  - b) Dolor punzante y paroxístico en una o más ramas del nervio trigémino
  - c) Pérdida de sensibilidad en la cara
  - d) Debilidad muscular facial
2. ¿Qué rama del nervio trigémino es más comúnmente afectada en la neuralgia del trigémino?
  - a) Rama oftálmica (V1)
  - b) Rama maxilar (V2)
  - c) Rama mandibular (V3)
  - d) Todas las ramas son igualmente afectadas
3. ¿Cuál de los siguientes factores puede desencadenar un episodio de neuralgia del trigémino?
  - a) Comer alimentos picantes
  - b) Estimulación ligera de la cara, como lavarse los dientes
  - c) Dormir en una posición incómoda
  - d) Exposición prolongada al sol
4. ¿Cuál es la primera línea de tratamiento farmacológico para la neuralgia del trigémino?
  - a) Antidepresivos tricíclicos
  - b) Anticonvulsivos como carbamazepina
  - c) Analgésicos opioides
  - d) Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)
5. ¿Qué examen de imagen es más útil para descartar causas secundarias de neuralgia del trigémino?
  - a) Radiografía de cráneo
  - b) Tomografía computarizada (TC) de cabeza
  - c) Resonancia magnética (RM) de cerebro
  - d) Ultrasonido de la región facial
6. ¿Qué signo o síntoma sugeriría una causa secundaria de neuralgia del trigémino, como un tumor o una esclerosis múltiple?
  - a) Dolor bilateral

- b) Episodios dolorosos de corta duración
  - c) Pérdida sensorial o debilidad facial
  - d) Dolor desencadenado por el frío
7. ¿Cuál es una posible complicación del tratamiento quirúrgico para la neuralgia del trigémino?
- a) Hipertensión arterial
  - b) Pérdida auditiva
  - c) Parálisis facial
  - d) Aumento de la frecuencia cardíaca
8. ¿Qué mecanismo subyacente se cree que causa la neuralgia del trigémino idiopática?
- a) Infección viral del nervio trigémino
  - b) Compresión vascular del nervio trigémino
  - c) Trauma directo al nervio trigémino
  - d) Degeneración de las fibras nerviosas
9. ¿Cuál de los siguientes pacientes tiene mayor riesgo de desarrollar neuralgia del trigémino?
- a) Paciente con historia de migraña
  - b) Paciente con diabetes mellitus
  - c) Paciente con hipertensión arterial
  - d) Paciente con esclerosis múltiple
10. ¿Qué medida no farmacológica puede ayudar a algunos pacientes a manejar los síntomas de la neuralgia del trigémino?
- a) Terapia de calor local
  - b) Terapia física
  - c) Técnicas de relajación y manejo del estrés
  - d) Dieta rica en calcio



### Cuestionario compresión nervio mediano

1. ¿Cuál de las siguientes estructuras NO es una causa de compresión proximal del nervio mediano?
  - a) Apófisis y ligamento de Struthers.
  - b) Lacerato fibroso bicipital.
  - c) Tubérculo del escafoides.
  - d) Inserciones humeral y cubital del pronador redondo.
  
2. ¿Cuál es el síndrome de compresión distal del nervio mediano más frecuente?
  - a) Síndrome del túnel del carpo.
  - b) Síndrome del pronador.
  - c) Síndrome de la salida torácica.
  - d) Síndrome de Guyon.
  
3. ¿Qué maniobra se realiza manteniendo una flexión máxima de la muñeca durante un minuto?
  - a) Signo de Tinel.
  - b) Maniobra de Phalen.
  - c) Prueba de Duran.
  - d) Prueba de Spurling.
  
4. ¿Cuál es la proporción de mujeres a hombres en la presentación del síndrome del túnel del carpo?
  - a) 3 a 1.
  - b) 5 a 1.
  - c) 7 a 1.
  - d) 9 a 1.
  
5. ¿Cuál de las siguientes NO es una causa ocupacional que puede llevar al síndrome del túnel del carpo?
  - a) Sobrecarga mecánica.
  - b) Uso prolongado del teclado.
  - c) Tabaquismo.

- d) Movimientos repetitivos de la muñeca.
6. ¿Cuál es el tratamiento inicial recomendado para el síndrome del túnel del carpo en una causa transitoria?
- Cirugía inmediata.
  - Colocación de férula en posición neutra.
  - Reposo absoluto.
  - Inyección de corticosteroides.
7. ¿Qué prueba consiste en la presión digital sobre la región del túnel carpiano durante 30 segundos?
- Signo de Tinel.
  - Maniobra de Phalen.
  - Prueba de Duran.
  - Prueba de Spurling.
8. ¿Cuál de las siguientes condiciones NO está relacionada con la compresión del nervio mediano en el túnel del carpo?
- Hipotiroidismo.
  - Gota.
  - Diabetes mellitus.
  - Hipertensión arterial.
9. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se puede agregar al manejo del síndrome del túnel del carpo si el dolor persiste?
- Antibióticos.
  - Neuromoduladores como pregabalina o gabapentina.
  - Antihistamínicos.
  - Inmunosupresores.
10. ¿Cuál es la razón principal para considerar la cirugía en el tratamiento del síndrome del túnel del carpo?
- Presencia de dolor leve.
  - Falta de respuesta al tratamiento conservador.
  - Aparición de parestesias solo nocturnas.



### Cuestionario Enfermedad de Parkinson

1. ¿Cuál es el sustrato patológico principal de los trastornos del movimiento en la enfermedad de Parkinson?
  - A) La médula espinal
  - B) Los núcleos de la base
  - C) El cerebelo
  - D) El córtex cerebral
2. ¿Qué neurotransmisor es especialmente importante en la fisiología de los núcleos de la base?
  - A) Serotonina
  - B) Noradrenalina
  - C) Dopamina
  - D) Acetilcolina
3. ¿Cuál es la función principal de los núcleos de la base en relación con el movimiento?
  - A) Proyectar directamente sobre la médula espinal
  - B) Recibir estímulos corticales y proyectar de nuevo hacia la corteza
  - C) Generar movimientos involuntarios
  - D) Inhibir todos los movimientos motores
4. La lesión de cuál de los siguientes núcleos se asocia con el parkinsonismo?
  - A) Núcleo subtalámico
  - B) Caudado
  - C) Putamen
  - D) Sustancia negra
5. ¿Cómo se define el temblor en el contexto de los trastornos del movimiento?
  - A) Contracciones involuntarias sostenidas
  - B) Movimientos lentos y prolongados
  - C) Oscilaciones rítmicas de una parte del cuerpo
  - D) Movimientos rápidos y aleatorios
6. ¿Cuál de los siguientes NO es una hipercinesia?
  - A) Temblor
  - B) Disonía
  - C) Bradicinesia
  - D) Coreoatetosis
7. ¿Qué circuito neuronal incluye conexiones entre el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido y la sustancia negra?
  - A) Lazo límbico
  - B) Lazo motor
  - C) Lazo cognitivo

- D) Lazo visual
8. ¿Cuál es una característica distintiva de la enfermedad de Parkinson en términos de neurotransmisores?
- A) Exceso de serotonina
  - B) Déficit de dopamina**
  - C) Exceso de acetilcolina
  - D) Déficit de noradrenalina
9. ¿Cuál es la clínica asociada a la lesión de la porción compacta de la sustancia negra?
- A) Hemibalismo
  - B) Coreoatetosis
  - C) Parkinsonismo**
  - D) Disonía
10. ¿Qué tipo de movimiento es común en pacientes con enfermedad de Parkinson?
- A) Movimientos rápidos y aleatorios
  - B) Movimientos rítmicos y oscilatorios**
  - C) Movimientos lentos y prolongados
  - D) Movimientos sostenidos e involuntarios