

**UDS**



**Universidad del sureste**

**Fredy cesar peña Lopez**

**segundo semestre**


**Licenciatura en medicina  
humana**

**Docente Irma Sanchez Prieto**

**Pública Salud**

**Actividad de plataforma**





# TOS FERINA

ES UNA ENFERMEDAD BACTERIANA ALTAMENTE CONTAGIOSA QUE OCASIONA UNA TOS VIOLENTA E INCONTROLABLE QUE PUEDE DIFICULTAR LA RESPIRACIÓN. A MENUDO SE ESCUCHA UN SONIDO "CONVULSIVO" PROFUNDO CUANDO LA PERSONA TRATA DE INSPIRAR.


SE CARACTERIZA POR LAS PERSONAS PUEDEN SUFRIR:

- TOS: CRÓNICA O INTENSA
- NASALES: CONGESTIÓN, CONGESTIÓN NASAL O ESTORNUDOS
- TODO EL CUERPO: FATIGA O FIEBRE
- TAMBIÉN COMUNES: ATAQUE INTENSO DE TOS, EPISODIOS DE AUSENCIA DE RESPIRACIÓN, OJOS LLOROSOS, VÓMITO




LAS COMPLICACIONES PUEDEN INCLUIR:

- NEUMONÍA
- CONVULSIONES
- TRASTORNO CONVULSIVO (PERMANENTE)
- HEMORRAGIA NASAL
- INFECCIONES DEL OÍDO
- DAÑO CEREBRAL POR FALTA DE OXÍGENO
- SANGRADO EN EL CEREBRO (HEMORRAGIA CEREBRAL)
- DISCAPACIDAD INTELLECTUAL
- DETENCIÓN DE LA RESPIRACIÓN O RESPIRACIÓN LENTA (APNEA)
- MUERTE



LOS ANTIBIÓTICOS RECOMENDADOS PARA EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN POST-EXPOSICIÓN DE LA TOS FERINA INCLUYEN AZITHROMYCIN (ZITHROMAX), ERYTHROMYCIN Y CLARITHROMYCIN (BIAIXIN). OTRA ALTERNATIVA ES USAR EL TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL (BACTRIM).



EL MÉTODO DE TRANSMISIÓN ES POR CONTACTO DIRECTO, TODO AQUEL QUE PROPICIE DE ESTAR CERCA AL FOCO DE INFECCIÓN ES SUSCEPTIBLE A CONTAGIARSE POR SALIVA, O POR FLUIDOS DE LA MISMA FORMA SU TRANSMISIÓN SE DA POR GÓTICAS EN EL AIRE DE MANERA DISIPADA EN EL ENTORNO



UNA DE LAS VACUNAS INFANTILES RECOMENDADAS, PROTEGE A LOS NIÑOS CONTRA LA INFECCIÓN DE TOS FERINA. LA VACUNA DTaP SE LE PUEDE ADMINISTRAR A LOS BEBÉS SIN PROBLEMA. SE RECOMIENDAN CINCO DOSIS DE DTaP. CON FRECUENCIA, SE LE ADMINISTRAN A NIÑOS DE LAS SIGUIENTES EDADES: 2 MESES, 4 MESES, 6 MESES, 15 A 18 MESES Y 4 A 6 AÑOS.

LA VACUNA Tdap SE DEBE APLICAR ALREDEDOR DE LA EDAD DE 11 O 12 AÑOS.



## CAUSAS

LA TOS FERINA O TOS CONVULSIVA ES UNA INFECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIA ALTA. ES CAUSADA POR LA BACTERIA BORDETELLA PERTUSSIS. ES UNA ENFERMEDAD GRAVE QUE PUEDE AFECTAR A PERSONAS DE CUALQUIER EDAD Y CAUSAR DISCAPACIDAD PERMANENTE EN LOS BEBÉS E INCLUSO LA MUERTE.



Bibliográfica  
Mayo clinic  
.com //tos ferina. Es..

