



NOMBRE DEL ALUMNO: **JACQUELINE MONTSERRAT SELVAS PÉREZ**

NOMBRE DEL TEMA: **CUADRO DE ESQUEMA DE VACUNACIÓN**

PARCIAL: **4°**

NOMBRE DE LA MATERIA: **PEDIATRIA**

NOMBE DEL PROFESOR: **MIGUEL MAZA LÓPEZ**

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: **MEDICINA HUMANA**

SEMESTRE: **6°**


FUENTE:

(sin fecha). **Gob.Mx. Recuperado el 29 de junio del 2024 de**
https://www.pediatría.gob.mx/archivos/transparencia/transfocal_cartillanin.pdf

de Salud, S. (n.d.). **Esquema de Vacunación. Gob.Mx. Recuperado el 29 de junio de 2024, de**
<https://www.gob.mx/salud/articulos/esquema-de-vacunacion>


SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS, 26 DE JUNIO DEL 2024

ESQUEMA DE VACUNACIÓN



	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	COMPOSICION	DOSIS	ESQUEMA	SITIO DE APLICACION
BCG	tuberculosis	preparación de bacterias vivas atenuadas derivadas de un cultivo de bacilos de Calmette y Guérin (<i>Mycobacterium bovis</i>).	única	al nacer	Brazo derecho
HEPATITIS B	Hepatitis B	contiene una de las <u>proteínas</u> que cubren al <u>virus de la hepatitis B</u> , que es llamada <u>antígeno de superficie de la hepatitis B</u> , la vacuna actualmente se fabrica usando <u>ADN recombinante</u>	<ul style="list-style-type: none"> primera segunda tercera 	<ul style="list-style-type: none"> al nacer 2 meses 6 meses 	≤ 18 meses de edad: muslo derecho ≥ 18 meses de edad: brazo izquierdo
PENTAVALENTE ACELULAR DPaT + VPI + Hib	Difteria, tosferina, tetanos, poliomielitis e infecciones por <i>H. influenzae b</i>	contiene diferentes sustancias que son parte de las bacterias y virus contra los que protege la vacuna: el toxoide diftérico I toxoide tetánicoel toxoide pertúsico (contra la Tos ferina), los virus de la poliomielitis inactivados tipos I, II y III	<ul style="list-style-type: none"> primera segunda tercera cuarta 	<ul style="list-style-type: none"> 2 mese 4 meses 6 meses 18 meses 	≤ 18 meses de edad: Muslo derecho ≥ 18 meses de edad: Brazo izquierdo
DPT	Difteria, tosferina y tetanos	Contiene los toxoides diftérico y tetánico así como fragmentos de proteína de la bacteria Bordetella pertussis causante de la Tos ferina.	refuerzo	4 años	Brazo izquierdo
ROTAVIRUS	Diarrea por rotavirus	<ul style="list-style-type: none"> Una vacuna llamada monovalente que está hecha de virus vivos atenuados (debilitados) que contiene un serotipo del virus. La otra vacuna es la llamada pentavalente, se elabora con virus vivos; contiene 5 serotipos de virus vivos atenuados. 	<ul style="list-style-type: none"> Primera Segunda Tercera Pentavalente: 3 dosis 	<ul style="list-style-type: none"> 2 meses 4 meses 6 meses Pentavalente: entre la sem 6-12 de edad con intervalo de 2 meses 	Oral
NEUMOCOCICA CONJUGADA	Infecciones por neumococo	olisacáridos purificados de 23 serotipos de neumococo (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F) con el agregado de fenol como conservante.	<ul style="list-style-type: none"> Primera segunda refuerzo 	<ul style="list-style-type: none"> 2 meses 4 meses 12 meses 	≤ 18 meses de edad: Muslo derecho

ESQUEMA DE VACUNACIÓN



	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	COMPOSICION	DOSIS	ESQUEMA	SITIO DE APLICACION
INFLUENZA	influenza	virus de influenza inactivado	<ul style="list-style-type: none"> Primera Segunda Revacunación 	<ul style="list-style-type: none"> 2 meses 4 meses anual hasta los 59 meses 	<p>≤ 18 meses de edad: Muslo derecho</p> <p>≥ 18 meses de edad: Brazo izquierdo</p>
SRP	Sarampión, rubéola y paratoiditis	Está hecha de virus vivos atenuados (debilitados).	<ul style="list-style-type: none"> Primera Refuerzo 	<ul style="list-style-type: none"> 1 año 6 años 	Brazo izquierdo
SABIN	poliomelitis	Hecha por virus vivos atenuados (debilitados), contiene los antígenos de los virus tipo I, II y III de la poliomielitis, por ello es trivalente; también contiene un estabilizador.	<ul style="list-style-type: none"> Primera Segunda Tercera 	<ul style="list-style-type: none"> iniciarla a partir de los 2-3 meses 2 meses después de la 1ra dosis 2 meses después de la 2da dosis 	Oral
SR	sarampion y rubeola	Se elabora utilizando virus vivos atenuados (debilitados) de sarampión, preparados en células humanas o en células de embrión de pollo y virus vivos atenuados de rubéola, preparados en células humanas.	<ul style="list-style-type: none"> Primera Segunda 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Meses 6 años 	Brazo izquierdo
MENINGOCOCO	Neisseria meningitidis de grupo C	Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Oligosacáridos de Neisseria meningitidis del grupo C (Cepa C11) 10 µg Conjugado a proteína CRM-197 de Corynebacterium diphtheriae 12.5 a 25 µg Adsorbido en Hidróxido de aluminio 0.3 a 0.4 mg Al3+ Vehículo cs 0.5 m	<ul style="list-style-type: none"> Primera hasta los 12 meses con intervalo de 2 meses 	<ul style="list-style-type: none"> 2 meses de edad hasta los 12 meses con intervalo de 2 meses 	Intramuscular
HEPATITIS A	Hepatitis A	25 unidades (U) del Antígeno del Virus de Hepatitis A	<ul style="list-style-type: none"> Primera 	<ul style="list-style-type: none"> 12 meses de edad 	muslo izquierdo
VARICELA	varicela	Contiene una cepa silvestre atenuada de varicela y trazas de gelatina y neomicina.	<ul style="list-style-type: none"> Primera Segunda 	<ul style="list-style-type: none"> 12 meses de edad 15 meses de edad 	Brazo izquierdo