

# UDS

## Mi Universidad

**Medicina Humana**

**Medicina Paliativa**

**Dra. Sheila Anahí Urbina Hernández**

**Unidad II**

**Delirio, Demencia y Depresión**


**Judith Anahí Díaz Gómez**

**6° Semestre**

**San Cristóbal De Las Casas Chiapas, A 26 De Abril Del 2024.**

# DELIRIO

Es una confusión grave y repentina debido a cambios rápidos en la actividad cerebral que ocurren con enfermedad física o mental.



## SÍNTOMAS

- Cambios en la lucidez mental (por lo regular más alerta en la mañana, menos alerta en la noche).
- Cambios en la sensibilidad (sensación) y la percepción.
- Cambios en el nivel de conciencia o conocimiento.
- Cambios en el movimiento (por ejemplo, puede ser de movimiento lento o hiperactivo).
- Cambios en los patrones del sueño, somnolencia.
- Confusión (desorientación) en cuanto a tiempo o lugar.
- Disminución en la memoria y recuerdos a corto plazo.
- Pensamiento desorganizado, como hablar de una manera que no tiene sentido.
- Cambios emocionales o de personalidad, como ira, agitación, depresión, irritabilidad y euforia.
- Incontinencia.
- Movimientos desencadenados por cambios del sistema nervioso.
- Problemas para concentrarse.

# DEMENCIA

## Trastorno Neurocognitivo Mayor

Es una pérdida de la función cerebral que ocurre a causa de ciertas enfermedades. Esto afecta a una o más funciones cerebrales como la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio o el comportamiento.



## SÍNTOMAS

- El comportamiento emocional o la personalidad.
- El lenguaje.
- La memoria.
- La percepción.
- Pensamiento y juicio (habilidades cognitivas).

La demencia aparece primero generalmente como olvido.

# DEPRESIÓN

La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un período de 2 semanas o más.



## SÍNTOMAS

- Agitación, inquietud, irritabilidad e ira.
- Volverse retraído o aislarse.
- Fatiga y falta de energía.
- Sentimientos de desesperanza, impotencia, inutilidad, culpabilidad y odio a sí mismo.
- Pérdida de interés o placer en actividades que antes disfrutaba, incluyendo el sexo.
- Cambio repentino en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso.
- Pensamientos de muerte o de suicidio.
- Problemas para concentrarse.
- Problemas para conciliar el sueño o exceso de sueño.

## Bibliografía:

- Delirio. (s/f). Medlineplus.gov. Recuperado el 26 de abril de 2024, de <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000740.htm>
- Demencia. (s/f). Medlineplus.gov. Recuperado el 26 de abril de 2024, de <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000739.htm>
- Depresión. (s/f). Medlineplus.gov. Recuperado el 26 de abril de 2024, de <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003213.htm>