

Candidiasis

Nombre del equipo: Ingrid Renata López Fino, Clara Elisa

Parcial: III

Nombre de la Materia: Enfermedades Infecciosas

Nombre del profesor: Dr. Francisco Javier López Hernández

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Cuatrimestre-Semestre



...

Definición

Enfermedad infecciosa que afecta la piel y las mucosas, producida por el hongo del tipo candida.



Etiología

Infecciones generalmente producidas por

- ✓ *Candida albicans*

Organismo normal de la flora comensal humana



- ✓ *Candida glabrata*
- ✓ *Candida parapsilosis*
- ✓ *Candida tropicalis*

Reside en las membranas mucosas de la cavidad oral y vaginal así como en el tracto gastrointestinal

Epidemiología


- Se estima que 75% de las mujeres tienen un episodio de Candidiasis vulvovaginal en su vida
- 10% tendrá 4 episodios de CVV al año

Tasas de incidencia mayores en mujeres en edad reproductiva mayores a 15 años


Factores de riesgo




Clasificación



Manifestaciones Clínicas



Diagnóstico



Tratamiento de CVV No Complicada

Fármaco	Dosis
Nistatina	100,000 U Una tableta u ovulo vaginal durante 14 días
Fluconazol	150mg por vía bucal, dosis única
Itraconazol	200mg dos veces al día durante un día



Tratamiento de CVV Complicada

Características	Fármaco	Dosis
CVV Severa	Fluconazol	150mg por vía oral una dosis y repetir a las 72h una segunda dosis
CVV en hospederos con enfermedades subyacentes	Nistatina Fluconazol	100,000 U Una tableta u ovulo vaginal durante 14 días 100mg, 150mg o 200mg vía oral cada tercer día por 3 dosis



Tratamiento de CVV Complicada



Características	Fármaco	Dosis
CVV por Candida no albicans	Nistatina	100,000 U Una tableta u ovulo vaginal durante 21 días
CVV en la paciente embarazada	Nistatina	100,000 U Una tableta u ovulo vaginal durante 14 días



Tratamiento de CVV Complicada

	Características	Fármaco	Dosis
CVV Recurrente	Tratamiento de inducción	Nistatina Fluconazol	100, 000 U una tableta u ovulo vaginal por via vaginal durante 14 días o 21 días en caso de C. glabrata 150mg por vía oral una dosis y repetir a las 72h una segunda dosis
	Tratamiento de mantenimiento	Fluconazol	100mg, 150mg o 200mg vía oral una sola dosis, una vez por semana durante 6 mese

