



**Mi Universidad**

## **Supernota**

**Nombre del Alumno:** Clara Elisa Encino Vázquez

**Nombre del tema:** Diferencias de lavado quirúrgico y clínico

**Nombre de la Materia:** Técnicas quirúrgicas básicas

**Nombre del profesora:** Dra. Katia Paola Martínez López

**Nombre de la Licenciatura:** Medicina Humana

Cuatrimestre-Semestre

*San Cristóbal de las Casas. 29 de mayo del 2024*

## Bibliografía

- Diapositivas de clase
- (S/f). Aucex.es. Recuperado el 28 de abril de 2024, de <https://www.aucex.es/wp-content/uploads/2018/03/incisiones-y-cierre-de-pared-abdominal-ana-isabel-ferrer-lopez.pdf>

# Lavado clínico y lavado de manos quirúrgico

Técnicas quirúrgicas básicas



## LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO

Es la remoción química de microorganismos que destruyen o matan la flora transitoria y remuevelas residentes presentes en la piel. Procedimiento por medio del cual se asean las manos, con base en principios de asepsia



## LAVADO DE MANOS CLINICO

El lavado de manos es la medida más importante para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos. Este proceso durara como mínimo 1 minuto.



## OBJETIVO

Eliminar los microorganismos transeúntes y reducir la flora residente



## OBJETIVO

Eliminar suciedad y microorganismos transeúntes de la piel.

## INDICACIONES

- Antes de cualquier intervención quirúrgica.
- Antes de realizar técnicas que requieran una extrema asepsia como colocación de catéter venoso central.

## INDICACIONES

- Al iniciar y finalizar la jornada laboral.
- Antes y después de realizar cualquier procedimiento al paciente.
- Antes y después de la preparación de alimentos o medicación.
- Antes y después de la realización de procedimientos invasivos.
- Después de contactar con cualquier fuente de microorganismos: fluidos biológicos, membranas mucosas, piel no intacta, objetos que puedan estar contaminados (cuñas, bolsas de diuresis).
- En el manejo de pacientes con criterios de aislamiento, colonizados o infectados por gérmenes multiresistentes de interés epidemiológico, ante brotes o alertas epidemiológicas

# Lavado clínico y lavado de manos quirúrgico

Técnicas quirúrgicas básicas



## TIPO DE JABON

- Soluciones antisépticas (clorhexidina)
- Povidona yodada al 7.5%
- Germicida



## TIPO DE JABON

- Jabón líquido antibacterial
- Antiséptico



## AREA DE LAVADO

Hasta los codos



## AREA DE LAVADO

3 cm arriba de la muñeca

## USO

Personal de salud antes de realizar algún procedimiento quirúrgico

## USO

Personal de salud antes y después de atender paciente

