



Mi Universidad

Nombre del Alumno: LUIS LÓPEZ LÓPEZ

Nombre del tema :TRATAMIENTO .

Parcial: 2DO

Nombre de la Materia : TERAPEÚTICA FARMACOLÓGICA

Nombre del profesor: BASILIO ROBLEDO MIGUEL

Nombre de la Licenciatura : MEDICINA HUMANA

Cuatrimestre: 3ER

PENICILINA G.

Es el fármaco de elección en el tratamiento de sífilis..

La penicilina G se administra por vía intramuscular o intravenosa.
La dosis IV normal para los adultos fluctúa entre 5 a 30 millones de UI/día mediante goteo continuo o en dosis fraccionada cada 2 a 4 horas.



Su presentación es en ampolletas de 400.000, 800.000 y 2.000.000 UI Y la penicilina benzatínica se presentan en ampolletas de 600.000 y 1.200.000 UI.

DOXICICLINA

Doxiciclina

Se usa sobre todo en la profilaxis selectiva de cólera para prevención de tifo y infecciones de treponema.

La dosis que se maneja en adulto. Es de 200mg en dos dosis fraccionadas en el primer día y después 100mg al día en una sola dosis.




Presentación

Se presenta en capsula de 50 y 100 mg.
Otras Presentaciones : tabletas.



TULAREMIA

Es una enfermedad infecciosa clásicamente transmitida por vector, de área geográfica circunscritas, provocada por francisella tularensis, bacterias muy virulenta que provoca en el humano diversos síndromes clínicos definidos.



Fotografía 2. Lesión primaria de forma ulcero-ganglionar.

Que es?

- Es una infección bacteriana poco frecuente provocada por el cocobacilio gram negativo francisella

Sinónimo

- Fiebre de la mosca del venado, fiebre del conejo.

Epidemiología


- Más frecuentes en niños de 5 a 9 años y vuelve a ser más frecuentes en adultos de 75 años. Más frecuente en hombres.

Cuadro clínico

- El período de incubación es en promedio de tres a seis días, aunque puede oscilar entre algunas horas y tres semanas.



Cuadro clínico

- Las seis forma clínicas de la tularemia son, de las frecuente : úlcero ganglionar, neumonía, tifoidea, orofaríngea y óculo ganglionar m





Fotografía 2. Lesión primaria de forma ulcero-ganglionar.



TRATAMIENTO

La primera línea es ESTREPTOMICINA, 10 mg/kg, IM dos veces al día.

Otras opciones.

Gentamicina. Dosis ponderal calculada

Ciprofloxacina.

Ambas durante 10 días

Doxiciclina o cloranfenicol

Se administra durante 14 o 21 días

FÁRMACO SEGÚN LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

1

Penicilina benzatinica G.

La penicilina G es el fármaco de elección en el tratamiento de sífilis. Resulta efectiva en la infección.

2

Dicloxacilina

100mg VO por 14 días

3

azitromicina

1g. VO.
Es un tratamiento efectivo en el sífilis.



Bibliografía.

- Guía de práctica clínica
- Manual de farmacología básica y clínica (Pierre Mitchel Aristil Chery).