


HAEMOPHILUS INFLUENZAE


Leticia Desiree Morales Aguilar

Tratamiento

MENINGITIS – TIPO B



EPIGLOTITIS - TIPO B



NEUMONIA – TIPO B

MONOTERAPIA - LEVE

Amoxicilina- VO
Adultos: 500 a
1000 mg cada 8
horas.

En infecciones
graves, las dosis
máxima no debe
exceder de 4.5
g/día.

MODERADO

Levofloxacino- VO
Adultos: 500 a 750
mg cada 24 horas.

Levofloxacino- IV
Adultos: 500 mg
cada 24 horas,
durante 7 a 14 días

Cefotaxima – IM o
IV. Adultos: 1 a 2 g
cada 6 a 8 horas.
Dosis máxima: 12
g/día.

Ceftriaxona – IM o
IV. Adultos: 1 a 2 g
cada 12 h, sin
exceder 4 g/día

GRAVE

Cefotaxima o
Ceftriaxona +
Macrolido o
fluoroquinolona
ambos IV

Adultos y niños mayores de 50 kg:

AMOXICILINA –
ACIDO
CLAVULÁNICO- VO
500 mg / 125 mg
cada 8 horas por 7
a 10 días.

EPOC - NO TIPIFICABLES



OTITIS MEDIA – NO TIPIFICABLES

Tratamiento

Amoxicilina a dosis de 80 a 90 mg/Kg de peso por día durante 5 a 10 días de acuerdo a la edad del paciente.

En > 6 años, la duración recomendada es de 5 a 7 días

En pacientes con otalgia moderada a grave, o fiebre $\geq 39^{\circ}\text{C}$)

Amoxicilina - 90 mg/kg/día con 6.4 mg/kg/día de ácido clavulánico, dividido en dos dosis

BIBLIOGRAFIA

- Harrison 21^a edición, volumen 1; pagina 1242 y 1243.
- GPC, Diagnóstico, tratamiento y prevención de Epiglotitis aguda; pagina 39 y 40
- Pierre- farmacología básica y clínica; pagina 264,.
- GPC, Prevención, Diagnóstico, tratamiento de NAC; pagina 41, 44, 47
- Kumate- infectología, pagina 902.
- GPC, Diagnóstico, y tratamiento de Otitis media; pagina 5.
- Katzung, apitulo 43, pagina 16,17/33