



NISSERIAS

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO



Infección de
cuello uterino,
uretra o recto

Ceftriaxona
250 mg IM
dosis única mas
Azitromicina
1 gr VO



Gonorrea no complicada

IM 125 mg

Niños con meningitis

100
mg/kg/dia
c/12

TRATAMIENTO ALTERNATIVO

Azitromicina 1 g VO dosis única



Cefotetan 1 g IM dosis única mas probenecid
1 g VO dosis única




Cefixima 400 mg VO dosis única




Cefotaxima 500 mg IM dosis únicas



TRATAMIENTO



TRATAMIENTO



Infección gonocócica diseminada

- Tratamiento inicial

Paciente que tolera los fármacos B lactámicos

- Ceftriaxona (1 g IM o IV c/24 h; tratamiento recomendado)
- cefotaxima (1 g IV c/8 h)

Paciente alérgico a los fármacos B lactámicos

- Espectinomicina (2 g IM c/12 h)

TRATAMIENTO DE MENINGITIS

Ceftriaxona IV en dosis altas 1 o 2 g c/12 a 24 hrs
y el tratamiento debe prolongarse durante 10 a 14 días



REFERENCIAS

Argente, H. A., & Álvarez, M. E. (2005). Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedeútica. Enseñanza basada en el paciente.

Jameson, J. L., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Loscalzo, J. (2019). Medicina Interna de Harrison – 1 volumes - 20.ed. McGraw Hill Brasil

Chéry, P. M. A., & Mitchel, P. (2013c). Manual de farmacología básica y clínica.