



# CLÍNICA

- Pérdida de memoria.
- Cambios de humor.
- Extravió de objetos.
- Dificultad para completar tareas cotidianas,



- Desorientación en tiempo y espacio.
- Cambios en la visión.
- Dificultad de comunicación,
- Falta de Criterio.
- Alejamiento social.

# DIAGNÓSTICO

Clinica.  
Mini mental Test de Folstein.  
Criterios NINCDS-ADRDA,  
Pruebas de laboratorio y gabinete.

# TRATAMIENTO

Donepezilo 5 mg/día, aumentar dosis a 10 mg/día.  
Rivastigmina 4.6-9.5 mg/día vía transdérmica.



# ETAPAS

Etapa preclínica.  
Etapa leve.  
Etapa moderada.  
Etapa grave.

# DEFINICIÓN

Trastorno neurodegenerativo progresivo e irreversible marcado por el deterioro cognoscitivo y conductual que interfiere significativamente con el funcionamiento social y ocupacional.




# EPIDEMIOLOGÍA

Primera causa de demencia a nivel mundial.  
Edad entre los 60 y 70 años de edad.  
Incidencia 16.9 por 1000/año para la región urbana y de 34.2 por 1000/año para la región rural.



# ETIOLOGÍA

Envejecimiento.  
Antecedentes familiares de Alzheimer.  
Depresión.  
Tóxicos.  
Metabólicos.



Nutricionales.  
Cognoscitivos.  
Psicológicos.  
Vasculares.  
Inflamatorios.  
Genéticos.



## DEFINICIÓN

TAG se caracteriza por angustia y preocupación debido a una serie de eventos y actividades que suceden en la persona.

## CLÍNICA

- Intranquilidad o impaciencia.
- fatigabilidad fácil.
- Dificultad para concentrarse.
- Irritabilidad.
- Tensión muscular.
- Alteraciones del sueño.

Clasifica en:

- físicos.
- Psicológicos.
- Conductuales.



## EPIDEMIOLOGÍA

Prevalencia mundial 3.8-25%  
Urbanas 5.7%  
Rural 4.9%  
Hospitalizados 15-50%  
+FC en Mujeres.  
El Riesgo < 47% después de los 80 años.

## DIAGNÓSTICO

Historia clínica.  
examen físico y mental.  
Comorbidades.  
Medicamentos.  
Laboratorios.  
GAI y GAI-SF.  
DSM-5.

## ETIOLOGÍA

Sexo femenino.  
Enfermedades crónico-degenerativo.  
Vivir solo, viudo o divorciado.  
Baja escolaridad.  
Eventos estresantes en su vida.  
EPOC y DM2.

## TRATAMIENTO

Terapia cognitivo conductual.  
Setralina 25 mg al día.  
Citalopran 10 mg a 20 mg.  
Escitalopram 5 mg al día.  
Paroxetina 10 mg al día

Venlafaxina de liberación prolongada 37.5 mg/día.  
Duloxetina 30 mg DMax 120 mg/día.