



...



PARACETAMOL

...



FARMACODINAMIA


EL PARACETAMOL PUEDE ACTUAR PREDOMINANTEMENTE INHIBIENDO LA SÍNTESIS DE PROSTAGLANDINAS A NIVEL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y EN MENOR GRADO BLOQUEANDO LA GENERACIÓN DEL IMPULSO DOLOROSO A NIVEL PERIFÉRICO.



PRODUCE EL EFECTO ANTIPIRÉTICO ACTUANDO A NIVEL CENTRAL SOBRE EL CENTRO HIPOTALÁMICO REGULADOR DE LA TEMPERATURA. PARA PRODUCIR UNA VASODILATACIÓN PERIFÉRICA QUE DA LUGAR A UN AUMENTO DE SUDORACIÓN Y DE FLUJO DE SANGRE EN LA PIEL Y PÉRDIDA DE CALOR.

FARMACOCINÉTICA

- SE ABSORBE RÁPIDA Y COMPLETAMENTE POR LA VÍA DIGESTIVA.
- EL TIEMPO MEDIO DE ABSORCIÓN DESDE EL INTESTINO DELGADO ES DE 7 MINUTOS.
- SU VIDA MEDIA PLÁSMATICA ES APROXIMADAMENTE DE 2 A 4 HORAS.
- APROXIMADAMENTE DEL 2 AL 5% DEL FÁRMACO ES EXCRETADO POR LA ORINA.



INDICACIONES TERAPÉUTICAS



ES UN ANALGÉSICO ANTIPIRÉTICO. SEGURO Y EFICAZ.

- REDUCIR LA FIEBRE
- DOLORES Y MALESTARES ASOCIADOS CON FIEBRE Y DOLOR.
- SÍNTOMAS DEL RESFRIADO COMÚN O AFECCIONES SIMILARES

DOSIS

VÍA ORAL.

- TABLETAS DE 500 MG: 1 TABLETA CADA 4 A 6 HORAS, SIN EXCEDER 3 GRAMOS (3 000 MG) POR DÍA.
- TABLETAS DE 750 MG: 1 TABLETA CADA 6 HORAS, SIN EXCEDER 3 GRAMOS (3 000 MG) POR DÍA.

PRESENTACIONES:

CAJA DE CARTÓN CON 20 TABLETAS DE 500 MG
CAJA DE CARTÓN CON 10 TABLETAS DE 750 MG



Maydelin Galvez Argueta.

Copyright © 2024 - PLM Latinoamérica