

Pancreatitis aguda

CIRUGÍA



DEFINICIÓN


Es la inflamación aguda del páncreas que puede causar complicaciones sistémicas y/o locales, así como la disfunción o falla orgánica.

MORTALIDAD

- Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica en las primeras 2 semanas.
- >2 semanas, se debe a sepsis y complicaciones

ETIOLOGÍA

- Cálculos biliares. - 66%
- Alcohol. - 41%
- Hipertrigliceridemia. - 8%



LA PA LEVE EL 80% ES AUTOLIMITADA Y SE RESUELVE EN UNA SEMANA



DIAGNÓSTICO

Requiere 2 de las 3 características

1.-Dolor abdominal, inicio agudo de un dolor epigástrico, se irradia a espalda.




- Náuseas, vómitos, distensión abdominal, estreñimiento, fiebre, escalofríos e ictericia.
- Signo de Cullen +
- Signo de Gray Turner.+



DIAGNÓSTICO

- 2.- Actividad de la lipasa sérica- amilasa, al menos 3 veces mayor que el límite.
- 3.- Hallazgos en TCC y RM.



La pancreatitis necrotizante solo se puede detectar en imágenes de 72-96 hrs del inicio de los síntomas.



CRITERIOS TOMOGRÁFICOS DE BALTHAZAR

Grado de lesión por tomografía computarizada	Puntuación
A Normal	0
B Agrandamiento difuso del páncreas	1
C Anomalías intrínsecas del páncreas asociado a cambios del tejido peripancreático	2
D Presencia de una colección mal definida	3
E Presencia de 2 o más colecciones líquidas mal definidas	4

Grado de necrosis	Puntuación	Suma de los puntos	Índice de severidad
0%	0	0 - 3	Bajo
<30%	2	4 - 6	Medio
30 - 50%	4	7 - 10	Alto
>50%	6		



CLASIFICACIÓN - ATLANTA

- **PA LEVE**
 - Ausencia de complicaciones locales o sistémicas y falla orgánica.
- **PA MODERADAMENTE GRAVE**
 - En el caso de complicaciones locales o sistémicas y en ausencia de falla orgánica persistente <48 hrs.
- **PA GRAVE**
 - Caso de falla orgánica persistente >48 hrs de un solo órganos o de múltiples.

ESCALA PRONÓSTICA EN PX CON PA

- APACHE II
- SOFA
- SIRS
- BISAP

TRATAMIENTO

3A

- Agua- solución Hartmann.
- Analgesia.
- Alimentación temprana- Dieta blanda.
- Antibiótico solo en infección secundaria confirmada.
 - Cefaxona IV
- ESCALA DEL DOLOR.
 - 1)
 - Ibuprofeno.
 - Diclofenaco.
 - Ketorolaco.
 - Paracetamol.
 - 2) Opiáceos bajos
 - 3)
 - Meperidina.
 - Morfina.
 - Tramadol
 - 4) Bupibacahina.
- Tratamiento quirúrgico.
-