



**Universidad del Sureste
Campus Comitán**

Alumna:

Esthephany Michelle Rodríguez López

Materia


Psiquiatría

Grado: 5 Grupo: A

Nombre del docente:

Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Comitán de Domínguez del 22 de Abril del 2024



INTRODUCCIÓN



La esquizofrenia no solo es una enfermedad, ya que comprende un grupo amplio de trastornos con etiologías heterogéneas, que se caracterizan por alteraciones de la percepción, emoción, cognición, pensamiento y comportamiento. Es de suma importancia mencionar que la esquizofrenia es un trastorno cerebral muy conocido, que abarca alteraciones estructurales y funcionales.

Como sabemos cada tipo de trastorno cuenta con diferentes signos y síntomas, los cuales se deben tener extrema precaución de no confundirlos, las personas que sufren con esquizofrenia pueden verse o sentirse como si hubieran perdido el contacto con la realidad, lo que puede ser angustiante para ellas, sus familiares y amigos.



Espectro a la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

Trastorno cerebral bien conocido, con alteraciones estructurales y funcionales

1

Fase activa: alucinaciones, delirios y pensamiento desorganizado.

Las fases prodrómica y residual: creencias extrañas y pensamiento mágico



2

Epidemiología

- Idéntica en ambos sexos, pero el trastorno masculino suele comenzar antes
- La edad máxima de inicio varía entre los 15 y los 35 años
- Hijos de madres que han sufrido gripe durante el embarazo.



3

Etiología

- Genética: Edad del padre > 60 años son vulnerables
- Consanguinidad: Gemelos monocigotos
- Estudios de adopción: > Padres biológicos de niños esquizofrénicos dados en adopción



4 Diagnóstico

Fenomenológico :

- Observación
- Descripción



5 Signos y síntomas DSM-5

2 signos o síntomas: mínimo de 1 mes o presentes durante 6 meses para confirmar.



SÍNTOMAS POSITIVOS

- Alucinaciones
- Delirios
- Lengua je desorganizado
- Comportamiento desorganizado
- Asociaciones laxas



SÍNTOMAS NEGATIVOS

- Afecto plano
- Alogia
- Abulia
- Anhedonia
- Atención



TIPOS DE ESQUIZOFRENIA

PARANOIDE

- Presencia de delirios de persecución o grandeza.
- Signos del paciente: tensos, suspicaces, cautelosos, reservados y, a veces, hostiles o agresivos.
- La inteligencia permanece intacta
- La edad de comienzo es tardía.



1)

DESORGANIZADO


- Comportamiento primitivo, desinhibido y caótico.
- Trastorno agudo en el pensamiento
- Aspecto descuidado, sonrisa abierta e incongruente y gesticulación.
- Edad de comienzo temprano, antes de los 25 años.



2)

CATATÓNICO

- FLEXIBILIDAD CÉREA
- Rigidez, estupor, adopción de posturas grotescas, ecopraxia
- Trastornos del habla
- Requiere asistencia médica debido a la desnutrición y agotamiento



3)

INDIFERENCIADO

- Delirios llamativos, alucinaciones, incoherencia o alteraciones graves del comportamiento
- No cumple con los criterios del tipo paranoide, catatónico o desorganizado.



4)

TIPO RESIDUAL

- Ausencia de delirios llamativos, alucinaciones, incoherencia o alteraciones graves de la conducta.
- Signos continuos de alteración de dos o más síntomas residuales (Embotamiento emocional, retraimiento social).



5)

BIBLIOGRAFÍA

Manual Del Bolsillo De Psiquiatría Clínica. Sadock, J. Namin/ Kaplan editorial LWW 2010 7a Ed.

CONCLUSIÓN

En conclusión, la esquizofrenia es un trastorno mental que incluye muchos síntomas diferentes y puede ser una enfermedad compleja, tanto para los pacientes como para los familiares. Es significativo tener en cuenta un diagnóstico y tratamiento adecuado, según sea el caso, para poder llevar una vida diaria saludable y productiva.

