



**Universidad del Sureste
Campus Comitán**

Trabajo Asignado:
Infografía de “Trastornos Bipolares”

Nombre del alumno:
Rosario Lara Vega

Materia
Psiquiatría

Grado: 5 Grupo: A

Nombre del docente:
Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Comitán de Domínguez, Chiapas del 23 de Mayo del 2024

Introducción

Los Trastornos Bipolares es un trastorno mental que puede ocasionar cambios inusuales y a menudo extremos que llegan a afectar el estado de ánimo, el nivel de energía y de actividad, y la concentración.

Las personas que padecen este tipo de trastorno también tienen episodios maníacos en donde ellos pueden sentirse muy optimista, eufórico o animado, al grado de sentirse nervioso o acelerado, más activo de lo habitual y llegar a tener muy mal genio o parecer extremadamente irritable. En los episodios depresivos, las persona puede sentirse triste, indiferente o desesperada, además de mostrar un nivel de actividad muy bajo. Algunas personas tienen episodios hipomaníacos, que son como episodios maníacos, pero son menos graves y problemáticos.

En estos tipos de trastornos de bipolaridad podemos encontrar los trastornos bipolares tipo I y II, ciclotímico, trastorno asociado a sustancias y medicamentos con posible padecimiento de base. Este tipo de trastorno bipolar puede ser un factor importante en el suicidio, por ello hay que aprender a diferenciar que este tipo de trastornos tendrán algo que los caracterice para poder llegar al diagnóstico y darle tratamiento para aquellas personas que padecen esta enfermedad.

TRASTORNOS BIPOLARES

Es un trastorno que se caracterizan por episodios alternativos de manía y hipomanía

TRASTORNO BIPOLAR CON CICLOS RÁPIDOS

•Cuatro o más episodios depresivos, maníacos o mixtos dentro de 12 meses. El trastorno bipolar con episodios mixtos o ciclos rápidos parece ser más crónico que el trastorno bipolar sin episodios alternos.



TRASTORNO BIPOLAR TIPO 1

Presencia de al menos un episodio maníaco completo, de un deterioro en la función social u ocupacional o incluye ideas delirantes y generalmente episodios depresivos.

TRASTORNO BIPOLAR TIPO 2

Presencia de episodios depresivos mayores al menos con un episodio hipomaniaco pero sin episodios maníacos completos.



TRASTORNO BIPOLAR INDUCIDO POR SUSTANCIAS-MEDICAMENTOS

Presencia de un trastorno del estado de ánimo compatible con manía que se desarrolla durante o poco después de una exposición, intoxicación o abstinencia de una sustancia


TRASTORNO BIPOLAR Y TRASTORNO RELACIONADO DEBIDO A OTRA AFECCIÓN MÉDICA

Alteración del estado de ánimo compatible con manía causada por una enfermedad, como es el síndrome de Cushing o un traumatismo encefalocraneano.



ETIOLOGÍA

- Simpaticomiméticos (p. ej., cocaína, anfetaminas)
- Alcohol
- Corticosteroides
- Ciertos antidepresivos (p. ej., tricíclicos, inhibidores de la recaptación de noradrenalina)
- Genética
- Desregulación de los neurotransmisores serotonina, noradrenalina, y dopamina.



CUADRO CLÍNICO

- Manía
- Hipomanía
- Depresión
- Características físicas

DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS BIPOLARES

- Niveles T4- TSH para detectar hipertiroidismo
- Exclusión del abuso de estimulantes mediante examen clínico o por cribado toxicológico en sangre u orina
- Pruebas de laboratorio sistemáticas (p. ej., hemograma completo, panel metabólico básico) para descartar otras afecciones médicas generales



TRATAMIENTO

- Clonazepam (1 mg, c/4-6 h)
- Lorazepam (2 mg, c/4-6 h)
- Psicoterapia
- Estabilizadores del estado de ánimo: litio y algunos anticonvulsivos, especialmente el valproato, la carbamazepina y la lamotrigina
- TEC



Conclusión

Los trastornos bipolares tiene un gran impacto a nivel social y familiar. Es fundamental que los familiares sepan manejar este tipo de situaciones, así como el comportamiento adecuado en las diferentes fases de la enfermedad.

La familia deberá identificar los síntomas de recaída referidos a cambios observados respecto al comportamiento habitual que pueda presentar, esto es con la finalidad de poder lograr de manera adecuada una entidad clínica, para realizar un diagnóstico precoz y oportuno y que esto no llegue a complicaciones como es el consumir sustancias tóxicas que puedan desencadenar una descompensación o que los pacientes lleguen a suicidarse. Es muy importante conocer este tipo de trastornos y sus subtipos, entender que esto es de etiología desconocida pero se asocia a la genética u otros problemas de importancia se ha mencionado.