



MEDICINA HUMANA

Yarely Arlette Morales Santiz

Dra. Mariana Catalina Saucedo Dominguez

Sexualidad Humana

3° A

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 26 de mayo de 2024.

Metodos

Anticonceptivos No H. reversibles



- Dio de cobre
- Condón masculino
- Condón femenino
- Capuchón cervical
- Espermicidas
- Metodos naturales



Metodos

Anticonceptivos NO H. irreversibles (Permanentes)

- Vasectomia
- OTB



Metodos

Anticonceptivos Hormonales


- Pildora
- Parche
- Inyecciones
- DIU mirena
- Implante
- Pildora de emergencia
- Anillo vaginal



Pildoras anticonceptivas combinadas.

Contiene estrógeno
y Progestina
(progesterona sintética)

Funciona impidiendo
la ovulación



Ingerido durante 21 días
Tomar una pildora el primer
día de la menstruación

El nivel ↑ de estrógeno inhibe
Producción de FSH y no estimula
la ovulación

↑ Progestina, - LH, impide la
ovulación

Progestina → conserva moco cervical
espeso = dificulta el paso del espermatozoide.

El uso de pildoras combinadas
es un método más efectivo
de control natal

Si ocurre un olvido, tomarla
en cuanto se acuerde (Hrs)

si se olvida durante días
será obtener otro método

Padecimientos del SC

- coagulación en sangre

< Probabilidad de trombos

→ En piernas → se ven a

Pulmones.

Accidente cerebral vascular

coágulos → conducen dolor,

Hospitalización y muerte



Problemas circulatorios

Infarto

Tumores hepáticos

Cáncer de mama

Madres en lactancia

Mujeres embarazadas

↑ cantidad de flujo vaginal
susceptibilidad a verrugas
< Clamidia

Provoca náuseas

↑ de peso


Efectos psicobióticos

Pildoras trifásicas
Nivel constante de
estrogéno

Pildoras que solo contienen
Progestina como micronor,
Nor-a D y Durette.

Minipildoras contienen
una dosis ↓ de progestina
y 0 de estrogéno

Toma una en el primer día
de menstruación y una
cada día.



Efectividad 100%

No interfiere en el coito

No es engorrosa

Reduce cantidad de flujo menstrual

Reduce cólicos

Regula la menstruación

Reduce acné

Protector EIP



No combinar con otros medicamentos o reducir

Provoca náuseas

↑ de peso

Efectos psicológicos

El costo de la pildora

Recordar el momento

No procrea

Protección con

ETS

Pildoras actuales niveles menores de estrógeno

↑ de progestina se relaciona con síntomas como vaginitis y depresión

Parche

Contiene estrógeno
y progestina

Se administra de
manera transdérmica

Consiste en una capa
protectora que contiene
Hormonas

El parche dura siete
días, se coloca uno
nuevo cada semana
durante tres semanas

Las H. ingresan al cuerpo
a través de la piel una
de sus ventajas que no
tiene que pasar por el
estómago



Sus expectativas es que
sus beneficios y efectos
serán similares a los
de la píldora

Anillo vaginal

Anillo flexible y transparente
contenido de H. estrogénico y
Progesterona.

Dosis poco menores, en la
parte más alta de la vagina,
permanece durante 21 días
y no lo utiliza durante
siete días, requiere
menos memoria

Los efectos secundarios
deben ser iguales que en
la Orlidora

Más efectivo que la
Orlidora



Inyecciones

Depo-Provera

Progestina aplicada
Por inyección

Funciona para inhibir
la producción engrosa
el moco cervical e inhibe
crecimiento del endometrio

Debe repetirse cada tres
meses

Es sumamente eficaz

No se han encontrado
efectos secundarios

No interfiere con el coito
Menos dependencia de
memoria

Disponible para mujeres
que no pueden utilizar
la píldora, como funcio-
narios < de 35 años

Problemas con presión
arterial



Sufren amenorrea
muchas mujeres famanceras
infértiles hasta 12 meses



Dispositivo intrauterino
Pequeña pieza de plástico

Médico o enfermera
insertan el DIU en el
útero, dos cordones
pasan por el cuello
del útero

Funciona impidiendo
la fertilización,
cambios en el útero y
trompas de falopio

DIU^H (Mirena y cobre)^{N. H. R}

Ambos tienen forma de
T
Uno contiene cobre y el
otro contiene progesterona

Dispositivo mirena libera
progesterona directamente
dentro del útero.
reduce el endometrio y
reducción del flujo
menstrual y - anemia



Pequeña cantidad de
cobre incluida en la T
de cobre, alteran el
funcionamiento de enzimas
implicadas en la implanta-
ción


Progestina engrosa el moco cervical, altera la ovulación y cambia el endometrio.

El DIU es sumamente efectivo

T de cobre son aumento de los cólicos menstruales, sangrados irregulares, ↑ del flujo menstrual

Mixtos reducen el flujo menstrual

Desventaja es su costo inicial



ventaja T de cobre duración de 10 años

mas efectivo que los pillores

No interrumee de ninguna manera el coito

No tiene que recordar utilizarlo

Diafragma

Pieza circular, con forma de cúpula, hecho de hule delgado y borde de metal flexible cubierto de hule



Bloquea la entrada del útero de modo que los espermatozoides no pueden entrar.

La crema mata cualquier espermatozoide que pase por la barrera.

Inserta dentro de la vagina, debe aplicarse una crema o jalea anticonceptiva sobre él.

Puede insertarse hasta seis horas antes del coito

Puede quedarse en su sitio hasta 24 horas

Primer método más efectivo de anticoncepción.

Pocos efectos secundarios

Posible irritación de la vagina o el pene por la jaleca o crema

Síndrome de shock

tóxico

No dejarse el diafragma

Por más de 6 a 8 horas

Arruina la espontaneidad del sexo

Pueden derramarse después del coito

Dura cerca de dos años

Pocos efectos secundarios

Es muy efectivo

Protección contra ETS
(Clamidia.)

Capuchón Cervical

Similar al diafragma
mayor ajuste alrededor
del cuello uterino

Misma efectividad
que el diafragma

ventaja puede permanecer
en su sitio durante 48
horas

Expertos mencionan que
no debe dejarse por
riesgo del Síndrome de
shock



El capuchón
cervical

El diafragma