



## Licenciatura en medicina humana

**Carlos Fernando Ruiz Ballinas**

**Dra. Mariana Catalina Saucedo  
Domínguez**

**Manual Métodos Anticonceptivos**

**Sexualidad Humana**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**3° “A”**



## Condón masculino

### ¿Qué es?

Es una funda de latex que se coloca sobre el pene antes de una relación sexual.

Este nulo te protege de un embarazo y además de infecciones de transmisión sexual.

### Efectividad

Si se usa de buena forma, es efectivo para evitar el embarazo.

### Cómo ayuda

Cómo una barrera que impide el paso de los espermatocitos hacia la vagina y óvulo.

### Su uso

Revisar que la fecha no sea superior a 5 años, que la envuelva aire y no esté rotado.

Se debe de colocar en el pene erecto antes de la penetración.

Rayter L

## Condón Femenino

### Que es:

Es una envoltura transparente blanda y resistente de latex o polivinilo con dos anillos de plástico (uno en cada extremo) y costuras sueldadas.

El anillo del extremo cerrado se usa para facilitar la inserción y sujetar el condón alrededor del orificio vaginal, el extremo abierto nos sirve y permanece fuera de la vagina abriendolo.

### Efectividad:

Es un método muy efectivo por cada 100 mujeres que lo usan entre 3 y 13 pueden recibir embarazos, depende del uso u no.

### Como actua:

Como barrera que cubre el orificio de la vagina e impide que el espermatocida llegue al óvulo.

### Como se usa:

La pellizca vigorosa y la envoltura tiene aire y no rota

Para su colocación el anillo cerrado del condón se sujetara entre los dedos pulgar y medio en forma de ocho.

Rayter

## Pastillas anticonceptivas.

Que son:

Son tabletas que evitan la ovulación en el ovario.

Efectividad:

Muy efectivo para evitar un embarazo.

De cada 100 mujeres que lo usan solo 1 queda embarazada.

Cómo actúa:

Contiene hormonas similares que inhiben la ovulación, así como la síntesis del óvulo impidiendo el embarazo.

Cómo se usa:

Existen dos tipos de pastillas.

1. Una se toma diariamente durante 28 días sin interrupción.

2. Se toma durante 21 días diariamente sin interrupción luego se suspende 7 días y se retoma al octavo día.

Rayter

## Parche anticonceptivo.

Que es:

Es un pequeño cuadro de plástico flexible que se adhiere dia y noche en el cuerpo para evitar una embarazo.

Efectividad:

Efectivo efectivo si se usa adecuadamente el riesgo de un embarazo es menor si la mujer no hace correcto cambio de parche.

Cómo actua:

Hormonas que inhiben la ovulación cambian la consistencia de la capa interna del útero y las características del nido cervical, impidiendo de este manera que ocurra una implantación.

Cómo se coloca:

La caja contiene 3 parches anticonceptivos

Cada parche tiene una cubierta de plástico transparente en cual lejos levantar la una esquina hasta llegar a una actividad fuerte la superficie adhesiva.

Rayter

## Implante subdermico

### Que es

Es una malla flexible que se coloca bajo la piel.  
Contiene hormona que produce el ovario en la mujer  
inhibiendo ovulaciones y evitando las consecuencias  
del nacimiento.

### Efectividad

Es un metodo efectivo por cada 100 mujeres q quedan embarazadas

### Como actua

Inhibe la ovulacion, evitando tener sus caracteristicas así evitando el embarazo.

### Como se coloca

Se aplica en zona local e inserta el implante por debajo de la piel  
en la parte interna del brazo.

No requiere de hospitalizacion solo un vendaje directo.

## Infecciones anticonceptivas.

Que son:

Están compuestas por hormonas sintéticas que  
modifican el cuerpo de la mujer.

Efectividad:

Efectivo para evitar el embarazo hasta un 99% de su eficacia.

Cómo actúa:

Contiene hormonas para la inhibición de la concepción.

Duración del efecto:

Según sus componentes su efectividad puede durar unos meses.  
Las infecciones normales producidas por 22 días desde la aplicación  
paran de modo se pierde la protección.

## Pastillas de anticoncepción de emergencia PAG

Que son:

Son pastillas anticonceptivas que previenen los embarazos no deseados después de haber tenido relaciones sexuales no planificadas y no protegidas. Existen dos presentaciones de una y las pastillas.

Efectividad:

De un grupo de 100 mujeres solo 2 quedan embarazadas.

Uso:

Si es posible debe tomarse lo antes posible dentro de las primeras 72 hrs después de la relación no protegida.

De las dosis, la primera tomase dentro de las primeras 72 hrs después de la relación sexual.

La segunda dosis 12 hrs después de la primera pastilla.

Rayter L

## Dispositivo intrauterino

Que es:

El DIU es un pequeño dispositivo de plástico en forma de "T" cubierta de alambre de cobre que se coloca en el útero de la mujer.

Duración:

Mientras el DIU este colocado el cobre que lo recubre evita la fecundación.

Efectividad:

Es un método con una alta efectividad sin embargo es recomendable usar el condón para evitar alguna EPI.

## Anillo vaginal.

Que es:

Es un aro flexible transparente y blando que mide 5 cm

Efectividad:

Es un 80% de efectivo debido a que depende el contacto del aro con finos.

Actua:

Este contiene hormonas que inhiben las funciones del ovario,  
si el anillo estuvo mas de tres horas en el exterior debe  
usar metodo de barrera.

Uso:

Se coloca el primer dia de menstruacion y se dejan durante tres  
semanas seguidas por 21 dias seguidos.

## Métodos permanentes.

Son:

Métodos definitivos de planificación familiar disponibles para mujeres y hombres que no desean tener hijos.

Efectividad:

Durante todo el tiempo

Son métodos alta mente seguros.

Activa:

La OTD es un método de planificación familiar en el cual se cortan y se retira trozos de pulpa evitando el paso óptico para unirce.

La vasectomía es un método de planificación familiar sencillo y definitivo que impide el paso de los espermatozoides por los conductos deferentes. Al no llegar al cuerpo eliminan los espermatozoides sin causar daños de salud.

Rayter L