



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITAN
LIC. EN MEDICINA HUMANA



SEXUALIDAD HUMANA

Cuadros comparativos (Desarrollo fetal, Cambios físicos y psicológicos, Signos de embarazo y Pruebas de embarazo)


Luis Brandon Velasco Sanchez

Dra: Mariana Catalina Saucedo Dominguez

3 A

SEMANA DE GESTACION	DESARROLLO FETAL
PRIMER TRIMESTRE	
Semana 1-4	<ul style="list-style-type: none"> • Más notable el desarrollo del feto • 3ra semana la gestación del feto mide 0.2 cm • 3ra y 4ta semana la cabeza se desarrolla más grande <ul style="list-style-type: none"> • 4ta semana, se comienza a formar el SNC • Final de la 4ta semana= Columna vertebral / presencia de una cola
Semana 5-8	<ul style="list-style-type: none"> • Formación de extremidades (Pies, manos) • 7ma semana desarrollo de órganos internos como hígado, pulmones, páncreas, riñones, intestinos. Formación de gónadas. • 8va semana desaparece la cola.
Semana 9-12	<ul style="list-style-type: none"> • 12va se distingue el género del feto <ul style="list-style-type: none"> • Mide 10 cm • Pesa 19 gr
SEGUNDO TRIMESTRE	
Semana 13-16	<ul style="list-style-type: none"> • 14va semana hay avivamiento
Semana 17-20	<ul style="list-style-type: none"> • 18va semana la mujer siente el movimiento del feto • 18va se puede detectar el latido del corazón (la gestación debe ser 20 semanas después de esto) <ul style="list-style-type: none"> • 20 semana el feto abre los ojos
Semana 21-24	<ul style="list-style-type: none"> • 24 semana el feto es sensible a la luz <ul style="list-style-type: none"> • escucha los sonidos en útero • el feto duerme y se mantiene despierto • la piel del feto esta arrugada y cubierta de vello sedoso
TERCER TRIMESTRE	
Semana 21-40	<ul style="list-style-type: none"> • Se forma depósitos de grasa por debajo de la piel (redundante) <ul style="list-style-type: none"> • Se pierde el vello sedoso • 7mo mes el feto rota y asume la posición de cabeza <ul style="list-style-type: none"> • 8vo mes el peso es de 2,500 gr • Termino peso 3,300 gr y mide 50 cm


Desarrollo del feto mes a mes



1 TRIMESTER

2 TRIMESTER

3 TRIMESTER



CAMBIOS FISICOS Y PSICOLOGICOS DE LA MUJER

Cambios físicos	Cambios psicológicos
PRIMER TRIMESTRE	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aumento de hormonas ➤ Inflamación (crecimiento) de mamas <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aereola oscurecida ➤ Náuseas y vomito ➤ Incremento de micción (orinar) ➤ Aumento de exudados vaginales <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mayor fatiga, sueño 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cambios emocionales por hormonas (de felicidad o tristeza) ➤ Factores: económico, preocupación por el nivel económico familiar (de la pareja) o madre soltera.
SEGUNDO TRIMESTRE	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4to mes, movimiento del feto(avivamiento) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aumento de tamaño de la pansa ➤ Desaparece los síntomas físicos del 1er trimestre <ul style="list-style-type: none"> ➤ Estreñimiento ➤ Sangrado nasal ➤ Edema en cara y extremidades ➤ Desarrollo completo de mamas ➤ 19 semana el calostro sale de los pezones(color amarillo a ámbar) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Disminución del miedo a un aborto por avivanamiento <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menor probabilidad de tener depresión ➤ Algunas mujeres están más angustiadas ➤ El comportamiento dependerá de las influencias culturales ➤ Algunas mujeres sienten alegría al ver el aumento de su panza otras mujeres reaccionan de manera negativa por el cambio de su cuerpo
TERCER TRIMESTRE	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aumento o disminución por conciliar el sueño (maromas o eructos) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Presión sobre los pulmones= Falta de respiración ➤ Incomodidad por crecimiento del útero ➤ Corazón bajo tensión (aumento del flujo sanguíneo) ➤ Mujeres delgadas suben de peso y viceversa <ul style="list-style-type: none"> ➤ Disminución de energía ➤ Líquido amniótico 2 litros ➤ Tamaño de útero 2 litros ➤ Tamaño de mamas 1,5 libras ➤ Otros líquidos 8 litros ➤ Camina como pato= dolor de espalda 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bienestar emocional con mujeres que tienen apoyo social ➤ Del 2 al 3er trimestre algunas mujeres presentan inconformidad con sus parejas ➤ Mujeres con menor apoyo emocional y social tiene una probabilidad de tener un bebe con bajo peso al nacer.

CAMBIOS FISCIOS Y PSICOLOGICOS DEL HOMBRE

FISICOS	PSICOLOGICOS
<ul style="list-style-type: none">▪ <u>SINDROME DE CAUVADE</u>▪ Algunos hombres experimentan síntomas del embarazo (Nauseas, cambios hormonales, indigestión, dolor de cabeza)▪ Cambios hormonales (Testosterona y prolactina)	<ul style="list-style-type: none">▪ Vinculo padre-lactante▪ Instinto de paternidad▪ Menor nivel de testosterona ayuda a la paternidad▪ Ambivalencia al principio acerca de paternidad cambia con el tiempo

PRUEBAS DE EMBARAZO

Las pruebas de embarazo son cruciales para confirmar el embarazo temprano mediante la detección de la hormona hCG. Esto permite iniciar el cuidado prenatal, monitorear el desarrollo fetal y tomar decisiones informadas sobre la salud materna y fetal. O inclusive para la práctica de un aborto, ya que es más seguro durante las primeras semanas del embarazo.

SINTOMAS

- Ausencia de la Menstruación (1er síntoma)
- Aumento de la temperatura basal, por niveles altos de progesterona
- Sensibilidad de mamas
- Nauseas
- Vomito
- Necesidad de dormir
- Aumento de micción

CLASIFICACION DE LOS SIGNOS

Signos presuntivos	<ul style="list-style-type: none">▪ Amenorrea▪ Sensibilidad en mamas▪ Nauseas
Signos probables	<ul style="list-style-type: none">▪ Pruebas de embarazo
Signos positivos a embarazo	<ul style="list-style-type: none">▪ Latido del corazón▪ Movimiento fetal▪ Ultrasonido

PRUEBAS DE EMBARAZO

Prueba inmunológica (basado en la detección de HCG)	<ul style="list-style-type: none">❖ El más común❖ 98 a 99% precisas❖ 7 días después de la implantación (solo cuando falla la menstruación)
Radio inmuno análisis beta-hCG	<ul style="list-style-type: none">❖ Analiza la presencia en sangre de beta-hCG❖ 7 días después de la fertilización
Prueba de embarazo casera	<ul style="list-style-type: none">❖ Detecta la hCG en orina❖ Mayor comodidad❖ Tasa de 25-38 % falsos negativos❖ Tasa de 16% de falsos positivos❖ se recomienda hacérsela de nuevo 1 semana después de la primera vez que se realizo
Ultrasonido	Desde el primer trimestre con la aparición de los síntomas

BIBLIOGRAFIA

- ✚ Sexualidad Humana / Janet Shibley Hyde Por: Shibley Hyde, Janet Idioma: Español Detalles de publicación: México : Mc Graw Hill, 2006 Edición: 9a Descripción.