Cuadro Sinomptico

Citlali Monserrath Campos Aguilar

Epidemiologia ll

Dr. Jesus Eduardo Cruz Dominguez

3 “A”

Comitán de Domínguez Chiapas 12 De Mayo del 2024

HIPERTENSION PRIMARIA

presión arterial alta

- Se divide en etapas 1 y 2 con base en las cifras de presion sistolica y diastolica.
  - **Hipertension sistolica** se define como una presion sistolica de 140 mmHg
    - **presion diastolica** menor de 90 mm HgS.
- Factores de rx no modificables
  - Antecedentes familiare
  - Cambios en la presion arterial relacionados con el envejecimiento
  - Etnia
  - Resistencia a la insulina y alteraciones
  - La tolerancia anomala a la glucosa, diabetes tipo2, hiperlipidemia, obe
- Fx de riesgo modificables
  - Consumo elevado de sal
    - Consumo excesivo de alcohol
- Manifestaciones clinicas
  - Daño organico
    - corazon
      - Cerebro
        - Add more levels as needed
- Diagnostico
  - Daño organico
    - Daño organico
      - Daño organico

DIABETES TIPO II

Enfermedad crónica que afecta el metabolismo de la glucosa, la principal fuente de energía del cuerpo.

- 2 **Factores de riesgo**
  - 3 Índice de masa corporal
    - Perímetro de la cintura
      - Antecedente familiar de diabetes en primero y segundo grado
        - Hipertensión arterial
          - Enfermedad isquémica coronaria o vascular de origen ateroesclerótica
- **Patogenia**
  - Factores genéticos
    - Factores ambientales
- **cuadro clinico**
  - Fatiga
    - Somnolencia
      - Pérdida de peso
        - Alteraciones del estado conciencia
- **DIAGNOSTICO**
  - Presencia de síntomas característicos o una glucemia plasmática casual > 200 mg/dl
    - Glucemia plasmática en ayuno > 126 mg/dl
      - 4 Polidipsia, poliuria, polifagia y baja de peso, acompañado del resultado de una glicemia
- **Tratamiento**
  - metformina es el medicamento de primera elección en la DMT-2
    - monoterapia en casos con contraindicaciones o falta de tolerancia para el uso del metformina.