



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITAN
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA**



Yarely Arlette Morales Santiz

3^aA

Epidemiología

Dr. Jesus Eduardo Cruz Dominguez

Comitán de Domínguez Chiapas a 21 de abril de 2024

SIFILIS

Infección bacteriana causada por *Treponema pallidum* que da lugar a una morbilidad y mortalidad sustanciales

Se transmite por contacto con genitales, el ano, el recto, los labios o la boca

Infección por sífilis



El diagnóstico de la sífilis se basa en la exploración física y las pruebas de laboratorio

Fases
primaria, secundaria,
latente y terciaria

Signos y Síntomas
Llagas, sarpullido en la piel o boca, fiebre, cefalea, dolor muscular


Tratamiento
Penicilina
doxiciclina



VIH/SIDA

(VIH) infecta los linfocitos T CD4 del sistema inmunitario, que ayudan al organismo a luchar contra las infecciones

«Sida» (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es un término que se aplica a las fases más avanzadas de la infección por el VIH



Signos y síntomas
fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, dolor de garganta, inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso

se transmite por intercambio de líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales




El VIH puede diagnosticarse mediante pruebas de diagnóstico rápido



La infección por el VIH no tiene cura

CLAMIDIA



La infección por la bacteria *Chlamydia trachomatis* es la infección de transmisión sexual (ITS) bacteriana

Se transmite por relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección con una persona con infección



La infección por *C. trachomatis* causa cervicitis en las mujeres y uretritis en los hombres


Sintomas en mujeres
Cambios en la secreción vaginal, sangrado después de las relaciones sexuales, sensación de ardor al orinar

Sintomas en hombres
sensación de ardor al orinar, secreción por el pene, dolor o molestias en los testículos



Tratamiento
Ofloxacina, azitromicina, doxiciclina, eritromicina

HERPES GENITAL



Es una ITS causada por el virus herpes simplex

Transmitido por contacto de boca a boca, contacto bucogenital, por vía sexual,

Ampollas dolorosas, fiebre y malestar, dificultad para orinar, dolor en la ingle, hormigueo, mucosa en los genitales



Diagnostico examen fisico, estudio citologico, cultivo viral.



Tratamiento Aciclovir, Valaciclovir, Fanciclovir

Personas con herpes genital deben usar condones

Bibliografia

- ° Sexualidad humana Ivan Arango de Montis 2008
 - ° Guia de practica clinica