

Universidad del Sureste
Licenciatura en Medicina Humana

José Carlos Cruz Camacho.

Dra. Arely Alejandra Aguilar Velasco

“semiología”.

“cuadro sinóptico”

Grado: 4

Grupo: “A”

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de junio del 2024.

INTRODUCCIÓN:

El sistema digestivo es fundamental para la descomposición y absorción de nutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo. Sin embargo, diversos trastornos pueden afectar su funcionamiento, manifestándose a través de una variedad de signos y síntomas digestivos. Estos síntomas pueden variar en severidad y naturaleza, e incluyen desde molestias leves hasta condiciones que requieren atención médica urgente.

Entre los síntomas digestivos más comunes se encuentran la dispepsia y la hemorragia digestiva. La dispepsia, también conocida como indigestión, se caracteriza por dolor o malestar en la parte superior del abdomen, hinchazón, náuseas y una sensación de llenura rápida. Es un síntoma común que puede estar asociado a múltiples causas, desde hábitos alimentarios hasta enfermedades subyacentes como la enfermedad por reflujo gastroesofágico o úlceras pépticas.

Por otro lado, la hemorragia digestiva es un signo de alarma que puede presentarse de diversas formas, como hematemesis, melena o hematoquecia. Este tipo de hemorragia puede ser indicativo de condiciones graves, como úlceras, varices esofágicas o cáncer gastrointestinal, y requiere atención médica inmediata.

Además de la dispepsia y la hemorragia digestiva, existen otros síntomas digestivos como náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal y distensión abdominal. La identificación y evaluación precisa de estos signos y síntomas es esencial para el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno de las enfermedades digestivas.

SIGNOS Y SINTOMAS DIGESTIVOS.

Dolor Abdominal

- Tipos
 - Agudo
 - Crónico
- Localización
 - Generalizado: Dolor en cualquier parte del abdomen.
 - Localizado
- Intensidad
 - La intensidad del dolores generalmente moderada salvo en complicaciones de la úlcera
- Periodicidad.
 - el paciente presenta épocas o periodos de dolor
- Ritmicidad.
 - el dolor se presenta a determinadas horas del día en relación con la vacuidad o llene del estómago
- Sintomas
 - El dolor suele ser otra manifestación del síndrome pilórico, dependiendo de la causa que lo origine, pudiendo corresponder a un síndrome ulceroso característico que alivia con el vómito cuando la causa es una úlcera péptica.



Nauseas y Vómito

- Causas
 - Infecciones
 - Intoxicaciones
- Frecuencias
 - Ocasional
 - Frecuente
- Sensación de necesidad de vomitar.
- Expulsión forzada del contenido estomacal.



Diarrea

- Características
 - Acuosa: Heces líquidas y frecuentes.
 - Sanguinolenta
- Dolor abdominal.
 - Urgencia defecar.
- Duración
 - Aguda
 - Crónica



Ictericia

- Coloración amarillenta
 - piel
 - ojos
- Asociada con:
 - Enfermedades hepáticas
- puede presentarse en enfermedades que no tienen relación directa con el hígado (ictericias hemolíticas, obstructivas, intrainfecciosas,)
- intensidad de la ictericia
 - es uno de los índices de gravedad de una enfermedad hepática, particularmente en el caso del daño hepático agudo.
 - La asociación de ictericia profunda, compromiso sensorial, fenómenos hemorrágicos y vómitos persistentes indica una insuficiencia hepática severa



Hemorragia digestiva

- Descripción
 - Pérdida de sangre a lo largo del tracto digestivo.
- Signos y Síntomas
 - Hematemesis
 - Melenas
 - Hematoquecia
- Otros
 - Debilidad.
 - Mareos.
 - Palidez.
 - Taquicardia.
 - Sudoración



Dispepsia

- Descripción
 - Malestar o dolor en la parte superior del abdomen.
- Síntomas
 - Dolor abdominal superior.
 - Sensación de llenura después de comer
 - Náuseas
 - Distensión abdominal.
 - Eructos.
 - Acidez o ardor estomacal



TIPOS DE DOLOR.

Dolor Somático

- Localizado
- Dolor agudo o punzante
- Aumenta con el movimiento o presión
- Relacionado con estructuras musculoesqueléticas

Dolor Visceral

- Difuso y mal localizado
- Profundo y sordo
- Asociado a órganos internos
- Puede ir acompañado de náuseas y vómitos
- Puede ir acompañado de cambios en la función de los órganos

Dolor Neuropático

- Ardiente
- Hormigueo
- Sensación de pinchazos
- Dolor que se irradia
- Asociado a daños en SN
- Dolor persistente o intermitente

Dolor Nociceptivo

- Puede ser agudo o crónico
- Resulta de la activación de nociceptores por daño tisular
- Incluye el dolor somático y visceral

Dolor Psicógeno

- No tiene una causa física evidente
- Relacionado con factores psicológicos, emocionales, y comportamentales
- Puede acompañar a otros tipos de dolor