



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITAN
MEDICINA HUMANA



EL INICIO DE LA
HISTORIA CLINICA

A large, faint watermark of the UDS logo and 'Mi Universidad' text is visible in the background of the page.

Citlali Anayanci Palacios Coutiño

Propedéutica, semiología y diagnóstico físico

Dra. Rosvani Margine Morales Irecta

4to semestre grupo A

Ficha de identificación

Nombre:

Edad:

Sexo:

Escolaridad:

Ocupación:

Nacionalidad:

Lugar de origen:

Lugar de residencia actual:

Numero telefónico:

Correo electrónico:

Estado civil:

Religión:

Fecha:

Hora:

Tipo de interrogatorio:

Motivo de consulta:

Antecedentes hereditarios y familiares

Abuelo paterno:

Abuela paterna:

Abuelo materno:

Abuela materna:

Padre:

Madre:

Hermanos:

Otros familiares:

Antecedentes personales patológicos

Enfermedades padecidas:

Tratamientos:

Tabaquismo:

Alcoholismo:

Otras toxicomanías:

Uso crónico de fármacos:

Combe:

Quirúrgicos:

Alergias:

Traumatismos:

Transfusiones:

Hospitalizaciones:

Antecedentes personales no patológicos

Características de vivienda:

Servicios básicos:

Zoonosis:

Fauna nociva:

Limpieza personal:

Alimentación:

Actividad física:

Desparasitación:

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA MÉDICA

APARATOS Y SISTEMAS:

Hiporexia: La hiporexia es un trastorno alimenticio que consiste en la pérdida gradual del apetito, lo que genera que la persona que lo padece deje de comer.

Polifagia: La polifagia es el aumento anormal de la necesidad de querer comer que puede deberse a ciertos trastornos psicológicos y ciertas condiciones médicas o a alteraciones de tipo hormonal.

Hipofagia: ingestión insuficiente de alimentos.

Hipodipsia: La hipodipsia primaria o trastorno de la sed por disfunción hipotalámica, es una causa rara de hipernatremia crónica.

Polidipsia: Necesidad de beber con frecuencia y abundantemente, que se presenta en algunos estados patológicos, como la diabetes.

Escalofríos: Sensación de tener frío, a menudo acompañada de temblores o escalofríos, aunque no estés necesariamente en un ambiente frío.

Diaforesis: sudoración excesiva o abundante que puede ser normal (fisiológica), resultado de la actividad física, de las condiciones ambientales o síntomas de una enfermedad.

Astenia: Falta o decaimiento de fuerzas caracterizado por apatía, fatiga física o ausencia de iniciativa.

Adinamia: Extremada debilidad muscular que impide los movimientos del enfermo.

Prurito: Sensación incómoda irritante que crea deseo de rascarse y que puede afectar a cualquier parte del cuerpo.

Lasitud: Desfallecimiento, cansancio, falta de fuerzas.

ORGANOS DE LOS SENTIDOS: OJOS

Diplopía: Ver dos imágenes de un objeto, también se conoce como visión doble.

Fosfenos: Seguro que alguna vez has cerrado con fuerza los ojos o te has frotado los párpados y al abrirlos has visto una especie de puntos de luz. Estos puntitos se conocen como fosfenos o fotopsias.

Escotomas: Un escotoma es una alteración en el campo de visión en la cual existe una zona en la que la visión es nula.

Miodesopsia: Manchas en la visión que se ven como puntos o hilos de color negro o gris que se desplazan a través de los ojos.

Presbicia: Defecto óptico caracterizado por la visión confusa de los objetos cercanos, cuando, a causa de la edad, disminuye la capacidad de acomodación del ojo.

Astenopia: Fatiga visual o fatiga ocular.

Nictalopía: La ceguera nocturna o nictalopía es una afección visual que impide la correcta visión en espacios poco iluminados, la persona que lo padece tiene dificultad de enfocar y por lo tanto de ver con claridad en situaciones de poca luz o en la oscuridad.

Amaurosis: La amaurosis fugaz es la pérdida temporal de la visión en un ojo debido a la ausencia de circulación de sangre a la retina.

Xeroftalmia: Enfermedad de los ojos caracterizada por la sequedad de la conjuntiva y opacidad de la córnea, que se produce por la falta de determinadas vitaminas en la alimentación.

Fotofobia: molestia ocular en presencia de luz brillante.

Exoftalmos: Hinchazón en uno o ambos ojos, que hace que se salgan de la cavidad.

Enoftalmos: patología ocular causada por el desplazamiento del globo ocular hacia el interior de la cuenca del ojo, haciendo que este parezca hundido o más pequeño.

NARIZ:

Anosmia: Pérdida parcial o completa del sentido del olfato.

Disosmia: sentido del olfato desagradable o distorsionado

Parosmia: Se trata de una afección en la que los olores, para los demás normales, ahora huelen y saben de forma desagradable o incluso repugnante

Cacosmia: Olor fétido.

Hiposmia: total incapacidad para detectar olores.

Hiperosmia: aumento de la sensibilidad olfatorio.

Fantasmia: te hace detectar olores que no están realmente presentes en tu entorno.

Epistaxis: Sangrado de la nariz, ya sea espontáneo o inducido por hurgarse o sufrir un traumatismo.

Congestión: Pasajes nasales inflamados por el exceso de fluidos y mucosidad, puede ser debido a una infección, humo de tabaco o perfumes.

Coriza: La rinitis es un trastorno que afecta a la mucosa nasal y que produce estornudos, picor, obstrucción, secreciones nasales y, en ocasiones, falta de olfato.

LARINGOFARINGE:

Odinofagia: Dolor al tragar alimentos o líquidos.

Disfonía: pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe.

Afonía: alteración máxima de la disfonía, la pérdida total de la voz.

GUSTO:

Ageusia: trastorno en el que la persona pierde por completo el gusto.

Disgeusia: Alteración o deterioro del sentido del gusto.

CARDIO RESPIRATORIO:

Disnea: Respiración difícil o trabajosa.

Ortopnea: Incomodidad al respirar mientras se está acostado en posición plana.

Trepopnea: término médico que se utiliza para describir un síntoma respiratorio caracterizado por la facilidad para respirar en una posición en lugar de otra.

Platipnea: dificultad para respirar que empeora al estar erguido (de pie o sentado) y mejora al acostarse boca arriba (plano).

Emetizante: tos tan intensa que induce el vómito.

Hemoptisis: expectoración de sangre proveniente del árbol traqueobronquial.

Diaforesis: sudoración excesiva o abundante

Palpitaciones: Sensación de que el corazón se acelera, late fuerte, sufre arritmia o se saltea latidos, a menudo molesta, pero raramente señal de una enfermedad del corazón.

Sibilancias: Sonido agudo al paso del aire por los conductos respiratorios, debido a un estrechamiento bronquial.

Estertores: Ruido de burbuja que se produce en ciertas enfermedades del aparato respiratorio y se percibe por la auscultación.

Cianosis: Color azulado o grisáceo de la piel, las uñas, los labios o alrededor de los ojos.

Sincope: Desmayo o pérdida temporal y súbita de la conciencia.

Lipotimias: Pérdida súbita y pasajera del sentido y del movimiento.

VASCULAR:

Ortostatismo: Forma de presión arterial baja que ocurre al ponerse de pie después de estar sentado o acostado.

Claudicación: Dolor, generalmente en las piernas, causado por el poco flujo sanguíneo, usualmente durante el ejercicio.

Hipotermia: Caída importante y posiblemente peligrosa de la temperatura corporal.

Hipertemia: Temperatura corporal elevada a niveles peligrosos, generalmente como consecuencia de un clima cálido y húmedo por tiempo prolongado.

URINARIO:

Disuria: dolor o la molestia al orinar

Tenesmo vesical: sensación persistente de ganas de orinar tras haber finalizado la micción

Poliuria: Producción anormal de grandes cantidades de orina.

Oliguria: Escasa producción de orina.

Anuria: Ausencia total de orina o en cuantía inferior a 50 ml en 24 horas.

Nicturia: Orinar con frecuencia durante la noche.

Enuresis: Pérdida de control de la vejiga durante la noche o mojar la cama, por lo general en niños.

Hematuria: La sangre en la orina puede variar de muy evidente a microscópica y no ser visible en absoluto.

Hemoglobinuria: coágulos sanguíneos y orina de color rojo o marrón en la mañana.

Proteinuria: Exceso de proteína en la orina.

Coluria: orinas de color muy oscuro por la presencia de bilirrubina en la orina

Bacteriuria: trastorno en el que las bacterias están presentes en la orina en cantidades superiores a las normales, pero no se producen síntomas.

Piuria: Presencia de pus en la orina.

Hipostenuria: incapacidad para concentrar la orina más de 450mOsm/kg en condiciones de deprivación hídrica

Isostenuria: Una orina en este rango (DU=1.008-1.012) indica que no existe concentración alguna, es decir, que su densidad es igual a la del plasma.

Neumatúria: expulsión de gas por la orina.

Incontinencia: Pérdida de control de la vejiga, que varía desde una pequeña pérdida de orina al estornudar, toser o reírse a la incapacidad total de controlar la orina.

Pujo: Gana continua o frecuente de defecar o de orinar, con gran dificultad de lograrlo y acompañada de dolores.

Estranguria: Micción dolorosa, frecuente y en muy pequeña cantidad.

Prostatismo: trastorno de la glándula prostática que por lo general se asocia con inflamación.

Prostatorrea: salida de secreción de origen prostático

GENITALES PENE:

Erección matinal: Es una reacción del propio cuerpo, que tienen una finalidad: mantener el pene en buen estado de salud.

Priapismo: Erección prolongada del pene, usualmente sin estimulación sexual.

Criptorquidia: Testículo que no se desplazó al saco de piel debajo del pene antes del nacimiento.

Varicocele: Engrosamiento de las venas en el escroto

Hemospermia: Presencia de sangre en la eyaculación.

Anorgasmia: retraso, la poca frecuencia o la ausencia de orgasmos (o la presencia de orgasmos significativamente menos intensos) después de la excitación sexual y una estimulación sexual adecuada.

Andropausia: proceso natural, en el cual las capacidades sexuales del hombre disminuyen con la edad, igual que otras funciones orgánicas.

GENITALES MUJERES:

Eumenorrea: reglas normales con duración de 3 a 4 días con periodicidad de 28 a 30 días y de intensidad media y de predominio diurno.

Amenorrea: Ausencia de períodos menstruales mensuales

Dismenorrea: Calambres y dolor pélvico durante la menstruación, con causas comunes como el flujo excesivo, la expulsión de coágulos, los fibromas de útero o la endometriosis.

Opsomenorrea: menstruación que se presenta a intervalos demasiado largos. ciclos de más de 35 días o retraso de más de 5 días en el inicio de la menstruación.

Proiomenorrea: ciclos de menos de 25 días o adelanto de más de 5 días en la aparición del sangrado menstrual.

Hipermenorrea: Sangrado vaginal intenso o prolongado con el ciclo menstrual.

Hipomenorrea: Períodos menstruales que se producen con menos frecuencia que el ciclo promedio de veintiocho días.

Polimenorrea: alteración en los ciclos menstruales que provoca periodos más cortos, menores a los 21 días.

Oligomenorrea: se define como menstruaciones poco frecuentes, ciclos menstruales que duran más de 45 días.

Menorragia: Sangrado vaginal intenso o prolongado con el ciclo menstrual.

Metrorragia: Sangrado del útero que se produce entre períodos, puede ocurrir cada un par de semanas y el flujo puede ser más intenso de lo normal.

Leucorrea: Flujo blanquecino de las vías genitales femeninas.

Hidrorrea: salida de líquido transparente por la vagina

Xantorrea: secreción amarillenta

Clolorrea: Flujo vaginal de coloración Verduzca

Prolapso: Abultamiento o caída de una parte del cuerpo, como el recto o la vagina, que comúnmente se produce por el debilitamiento de los tejidos de apoyo.

Dispareunia: Dolor genital persistente o recurrente que se produce justo antes, durante o después del coito.

Vaginismo: espasmo de los músculos que rodean la vagina, que ocurre en contra de su voluntad.

Anorgasmia: retraso, la poca frecuencia o la ausencia de orgasmos (o la presencia de orgasmos significativamente menos intensos) después de la excitación sexual y una estimulación sexual adecuada.

Menopausia: Disminución natural de las hormonas reproductivas cuando una mujer llega a los cuarenta o cincuenta años.

Climaterio: período de transición en la vida de la mujer, entre la etapa reproductiva a la no reproductiva