

UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITÁN.

MATERIA

PROPEDÉUTICA, SEMIOLOGÍA Y
DIGNOSTICO FÍSICO

TEMA:

INICIO DE LA HISTORIA CLINICA Y
GLOSARIO .

DOCENTE:

DR ROSVANI MARGINE MORALES
IRECTA.

ALUMNO:

RONALDO DARINEL ZAVALA
VILLALOBOS

MEDICINA HUMANA CUARTO
SEMESTRE G.A”

FICHA DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:

SEXO:

CURP:

ESTADO CIVIL:

OCUPACIÓN:

RELIGION:

HABLA ALGUNA LENGUA:

TIPO DE SANGRE:

ALERGIAS:

DOMICILIO:

LUGAR DE RESIDENCIA:

TELÉFONO:

TELÉFONO DE CONTACTO:

NOMBRE DEL FAMILIAR RESPONSABLE:

TIPO DE INTERROGATORIO:

MOTIVO DE CONSULTA

ANTECEDENTES HEREDITARIOS Y FAMILIARES:

ABUELO PATERNO:

ABUELA PATERNA:

ABUELO MATERNO:

ABUELA MATERNA:

PADRE:

MADRE:

HERMANOS:

OTROS FAMILIARES:

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS

ENFERMEDADES PADECIDAS:

TABAQUISMO:

ALCOHOLISMO:

OTRAS TOXICOMANIAS:

USO CRONICO DE FARMACO:

COMBE:

QUIRURGICOS:

ALERGIAS:

TRAUMATISMOS:

TRANSFUSIONES:

HOSPITALIZACIONES:

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

VIVIENDA:

SERVICIOS BASICOS:

ZOONOSIS:

FAUNA NOSIBA:

LIMPIEZA PERSONAL:

ALIMENTACION:

ACTIVIDAD FISICA:

DESPARACITACION:

ANTECEDENTES GÍNECO-OBSTÉTRICOS

MENARCA:

IVSA:

NPS:

METODO DE PLANIFICACION FAMILIAR

GLOSARIO

DIAFORESIS: hace referencia a la sudoración excesiva o abundante.

ASTENIA: sensación generalizada de cansancio, falta de fuerzas, debilidad muscular y lentitud psíquica.

ADINAMIA: Dificultad o ausencia de la iniciación de una acción o de un movimiento.

LASITUD: sensación de cansancio, debilidad y falta de interés en las actividades diarias.

PRURITO: sensación de picazón que provoca el deseo de rascar la piel.

fotofobia: molestia ocular en presencia de luz brillante.

XEROFTALMÍA: sequedad de la conjuntiva (la membrana que recubre los párpados y cubre la parte blanca del ojo) y la córnea (la capa transparente en la parte frontal del iris y la pupila).

DIPLOPIA: alteración visual que consiste en la percepción de visión doble.

escotomas: alteración en el campo de visión en la cual existe una zona en la que la visión es nula

MIODESOPSIAS: son manchas que aparecen en nuestro campo visual y que pueden llegar a afectar nuestra visión.

PRESBICIA: es cuando los ojos pierden gradualmente la capacidad para ver objetos de cerca.

ASTENOPIA: fatiga visual acompañada o no de cefalea frontal o periocular, que se produce en situaciones que requieren una fijación prolongada de la vista.

NICTALOPIA: afección visual que impide la correcta visión en espacios poco iluminados.

AMAUROSIS: privación total de la vista.

OTALGIA: sensación de dolor ótico.

OTORRAGIA: sangrado por uno o ambos oídos.

OTORREA: secreción líquida que proviene del oído.

HIPOACUSIA: es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos.

presbiacusia: pérdida de la audición relacionada con la edad.

EXOFTALMOS: ojos que sobresalen de su posición normal.

ENOFTALMOS: desplazamiento del globo ocular hacia el interior de la cuenca del ojo.

EPISTAXIS: hemorragia nasal.

ANOSMIA: pérdida del olfato.

DISOSMIA: sentido del olfato desagradable o distorsionado.

HIPOSMIA: reducción en la capacidad para detectar olores.

HIPEROSMIA: aumento de la sensibilidad olfatoria.

PAROSMIA: oler de forma desagradable o incluso repugnante.

CACOSMIA: alteración del sentido del olfato, que causa una percepción anormal de los olores.

CORIZA: inflamación aguda de la mucosa nasal de origen viral, habitualmente complicada por una sobreinfección bacteriana.

LARINGOFARINGE: parte realmente común a las vías digestiva y respiratoria, extendiéndose desde la base de la epiglotis al orificio esofágico, situado dorsalmente al cartílago cricoides.

DISFONIA: pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe.

AFONIA: pérdida total de la voz.

AGEUSIA: pérdida completa del gusto.

DISGEUSIA: mal sabor persistente en la boca.

ODINOFAGIA: dolor en la faringe.

DISNEA: dificultad respiratoria o falta de aire.

OPTORNEA: dificultades al inhalar adecuadamente aire y se encuentra acostada boca arriba.

PLATIPNEA: disnea e hipoxemia en situación de bipedestación.

DISNEA PAROXISTICA NOCTURNA: problema de respiración generalmente cuando está acostado.

BRONQUITIS: inflamación del revestimiento de los bronquios.

PRECORDIALGIA: sensación álgida, descrita en términos de opresión, constricción, pesadez o tirantez centro torácica.

SINCOPE: pérdida súbita y breve de la consciencia con ausencia de tono postural seguida de recuperación espontánea.

LIPOTIMIAS: sensación de mareo, sin pérdida de conocimiento, durante un periodo de tiempo muy corto y con recuperación rápida y completa.

POLIURIA: producción de orina de > 3 l por día.

OLIGURIA: situación en la que la cantidad de orina eliminada es insuficiente para la eliminación completa de las sustancias tóxicas producidas por el organismo.

ANURIA: ausencia total de orina o en cuantía inferior a 50 ml en 24 horas.

DISURIA: dolor o la molestia al orinar.

NICTURIA. despertarse con frecuencia durante la noche para orinar.

OPSIURIA: retraso en la eliminación del agua ingerida.

ENURESIS: orinar sin querer mientras se duerme.

COLURIA: presencia de bilirrubina en la orina.

PIURIA: presencia de glóbulos de pus en la orina.

NEUMATURIA: expulsión de gas por la orina.

NICTEMERO: todo organismo que tiene una vida de un día.

PROSTATISMO: síntomas de tracto urinario inferior asociados a hiperplasia de próstata.

PROSTATORREA: secreción que sale por la uretra.

ERECCION matinal: cuando no hay erección matutina.

PRIAPISMO: erección prolongada del pene.

CRIPTORQUIDEA: fracaso de uno o ambos testículos para descender en el escroto.

VARICOCELE: es la dilatación de las venas dentro de la piel flácida que sostiene los testículos (escroto).

HEMOSPERMIA: es la dilatación de las venas dentro de la piel flácida que sostiene los testículos (escroto).

URORGASMIA: impotencia.

ANDROPASIA: es el proceso natural, en el cual las capacidades sexuales del hombre disminuyen con la edad, igual que otras funciones orgánicas.

EUMENORREA: reglas normales con duración de 3 a 4 días con periodicidad de 28 a 30 días y de intensidad media y de predominio diurno.

AMENORREA: es la ausencia de menstruación, que a menudo se define como la ausencia de uno o más períodos menstruales.

DISMENORREA: afección menstrual que se caracteriza por calambres menstruales severos y frecuentes y dolor relacionado con la menstruación.

OPSOMENORREA: indica menstruación que se presenta a intervalos demasiado largos.

PROJOMENORREA: ciclos de menos de 25 días o adelanto de más de 5 días en la aparición del sangrado menstrual.

HIPERMENORREA: consiste en un sangrado abundante con la menstruación.

HIPOMENORREA: cuando el cuerpo expulsa unos 50 ml o menos durante la menstruación.

POLIMENORREA: alteración en los ciclos menstruales que provoca periodos más cortos, menores a los 21 días.

OLIGOMENORREA: trastorno menstrual que se caracteriza por tener ciclos menstruales pocos frecuentes.

METRORAGIA: es el sangrado vaginal que ocurre entre los periodos menstruales de una mujer.

LEUCORREA: flujo blanco, secreción vaginal.

HIDROREA: secreción profusa acuosa genital.

XANTORREA: secreción amarilla.

COLORORREA: la persona pierde grandes cantidades de cloro a través de la diarrea.

PROLAPSO: ocurre cuando los músculos y los ligamentos del suelo pélvico se estiran y debilitan.

DISPAREUNIA: dolor al tener relaciones sexuales.

VAGINISMO: espasmo de los músculos que rodean la vagina, que ocurre en contra de su voluntad.

ANORGASMIA: retraso, la poca frecuencia o la ausencia de orgasmos.

MENOPAUSIA: es el momento que marca el final de los ciclos menstruales.