



Efraín de Jesús Gordillo García

Infografía: Dislipidemias

Terapéutica farmacológica


4°A

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de abril del 2024

DISLIPIDEMIAS

concentración elevada de colesterol y/o triglicéridos o una concentración baja de colesterol de lipoproteínas de alta densidad




Factores de riesgo

- sedentarismo
- ingesta de grasas saturadas
- obesidad
- diabetes M2
- Alcoholismo

Diagnostico

- Hipercolesterolemias
- aterosclerosis
- hipertriglicemia




Signos clínicos

- Anillo corneal
- xantomas sobre tendones exteriores
- xantelomas pulmonares y cutaneos

Tratamiento no farmacologico

- Dieta
- ejercicio 30 min al día
- dejar de fumar
- limitar consumo de alcohol
- evitar alimento con grasas saturadas



Farmacológico

- Estatinas

dislipidemia primaria

dislipidemia secundaria

mutaciones geneticas

tipo mas frecuente

dislipidemias en niños secundaria de enfermedades aterosclerosis prematuras y con niveles de colesterol en sangre mayor a 6.2 mmol/l

causado por estilo de vida, sedentarismo e ingesta elevada de grasa saturadas y colesterol

dislipidemia primaria	dislipidemia secundaria
mutaciones geneticas	tipo mas frecuente
dislipidemias en niños secundaria de enfermedades aterosclerosis prematuras y con niveles de colesterol en sangre mayor a 6.2 mmol/l	causado por estilo de vida, sedentarismo e ingesta elevada de grasa saturadas y colesterol