



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITAN
MEDICINA HUMANA**




MEDICAMENTOS

PASIÓN POR EDUCAR

**CESAR FELIPE MORALES SOLIS
4-A**

PASIÓN POR EDUCAR

COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS A 28 DE JUNIO 2024



POKEDEX DE
FARMACOS



CESAR FELIPE

MORALES SOLIS



4-A



CESAR FELIPE
MORALES
SOLIS
4-A
POKEDEX
MEDICAMENTOS
TERAPIA
FARMACOLOGICA



001 Metformina

medicamento oral que se utiliza principalmente para tratar la diabetes tipo 2



PRESENTACION

Caja con 30 tabletas de 850 mg cada una.

Caja con 30 tabletas de 1 g cada una.

NORMAL

POISON

CONTRAINDICACIONES:

- Insuficiencia renal severa
- Enfermedades hepáticas severas
- Consumo excesivo de alcohol

MECANISMO DE ACCION:

disminuye la gluconeogénesis hepática, lo que reduce la cantidad de glucosa liberada al torrente sanguíneo

REACIONES ADVERSAS:

- náuseas
- diarrea
- dolor abdominal
- pérdida de apetito

INDICACIONES:

- Diabetes tipo 2
- Síndrome de ovario poliquístico
- Prevención de la diabetes


DOSIS

ADULTOS:

una dosis inicial de 500 mg u 850 mg dos veces al día con o sin alimentos, aumentando gradualmente hasta 3 veces al día sin exceder de 3 g por día.



CESAR FELIPE
MORALES
SOLIS
4-A
POKEDEX
MEDICAMENTOS
TERAPIA
FARMACOLOGICA



002 Glibenclamida
antidiabético oral que se utiliza para el tratamiento de la diabetes tipo 2

PRESENTACION
Frasco con o sin caja con 15, 30, 50 o 60 tabletas de 5 mg
Caja con 30, 50 o 60 tabletas de 5 mg.

NORMAL **ROCK**

CONTRAINDICACIONES:
• Diabetes tipo 1
• Cetoacidosis diabética
• Insuficiencia renal o hepática severa
• Embarazo y lactancia

MECANISMO DE ACCION: actúa sobre las células beta del páncreas para aumentar la liberación de insulina	REACIONES ADVERSAS: • Hipoglucemia • aumento de peso • Náuseas • Erupciones cutáneas	INDICACIONES: • Diabetes tipo 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

DOSIS
ADULTOS:
La dosis inicial de glibenclamida es de 5 mg diarios y debe discontinuarse a los 5 o 7 días. Según la respuesta del paciente, la dosis puede ajustarse. La dosis máxima es de 20 mg.





003 Insulina NPH

tipo de insulina de acción intermedia que se utiliza para el tratamiento de la diabetes



PRESENTACION

aja con un frasco ampula con 5 ml ó 10 ml (100 UI/ml).

NORMAL

BUG

CONTRAINDICACIONES:

- Diabetes tipo 1
- Cetoacidosis diabética
- Insuficiencia renal o hepática severa
- Embarazo y lactancia

MECANISMO DE ACCION:
 baja los niveles de glucosa en sangre facilitando la absorción de glucosa por las células, principalmente en el músculo y el tejido adiposo

REACIONES ADVERSAS:

- alergia local
- lipodistrofia
- resistencia a la insulina
- reaccion de hipersensibilidad

INDICACIONES:

- Diabetes tipo 2

DOSIS

ADULTOS:
 0.2-0.3 UI/KG La dosis puede ser ajustada en incrementos de 2-4 unidades una o dos veces por semana, basándose en los niveles de glucosa en sangre

CESAR FELIPE
 MORALES
 SOLIS
 4-A
 POKEDEX
 MEDICAMENTOS
 TERAPIA
 FARMACOLOGICA





004 GLIPIZIDA

antidiabético oral que se utiliza para el tratamiento de la diabetes tipo 2



PRESENTACION

Cajas con 30, 60 ó 100 comprimidos de 5 mg.

Cajas con 15, 30 ó 100 comprimidos de 10 mg.



CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a la glipizida
- En la diabetes Tipo I
- cetoacidosis diabética
- coma diabético.

MECANISMO DE ACCION:
actúa sobre las células beta del páncreas para aumentar la liberación de insulina

REACIONES ADVERSAS:

- Trastornos de la sangre y del sistema linfático
- Hiponstremia
- Trastornos del sistema nervioso

INDICACIONES:


- Diabetes tipo 2

DOSIS

ADULTOS:

dosis inicial recomendada es de 5 mg/día, administrada antes del desayuno o una merienda. La dosis diaria máxima recomendada en una sola toma, es de 15 mg

CESAR FELIPE
MORALES
SOLIS
4-A
POKEDEX
MEDICAMENTOS
TERAPIA
FARMACOLOGICA



CESAR FELIPE
 MORALES
 SOLIS
 4-A
 POKEDEX
 MEDICAMENTOS
 TERAPIA
 FARMACOLOGICA



005 FENFORMINA

medicamento oral que se utiliza principalmente para tratar la diabetes tipo 2



PRESENTACION
 se presenta en caja con 40 tabletas ranuradas en cellopolial.

NORMAL

STEEL

CONTRAINDICACIONES:

- Diabetes tipo 1
- coma y precoma
- cetoacidosis
- insuficiencia renal e insuficiencia hepática
- infecciones severas procesos febriles

MECANISMO DE ACCION: disminuye la gluconeogénesis hepática, lo que reduce la cantidad de glucosa liberada al torrente sanguíneo	REACIONES ADVERSAS: • Náuseas, vómito, pesantez y sensación de plenitud epigástrica, diarrea • Hepatitis o ictericia colúrica	INDICACIONES: • Diabetes tipo 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

DOSIS

ADULTOS:
 La dosis de GLINORBORAL[®] comienza con 1/2 tableta antes del desayuno o la comida principal, aumentando cada 8 días en 1/2 tableta si es necesario, hasta un máximo de 2 tabletas al día.





006 Penecilina-G

antibiótico para uso parenteral producido por el *Penicillium chrysogenum*

PRESENTACION

Frasco ampolla de 1'200.000 U.I. incluye ampolla de disolvente con lidocaína. Caja por 10.

Frasco ampolla de 2'400.000 U.I. incluye ampolla de disolvente con lidocaína. Caja por 10.

NORMAL

ICE

CONTRAINDICACIONES:

- Reacciones de hipersensibilidad.
- Alergia a las penicilinas.
- Insuficiencia renal.
- Embarazo y lactancia

MECANISMO DE ACCION:

Inhibe la tercera y última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana

REACIONES ADVERSAS:

- | Hipersensibilidad
- | ,erupciones a nivel cutáneo
- | acompañado en la mayoría
- | de los casos de fiebre.

INDICACIONES:

- | Infecciones invasivas por estreptococos beta hemolíticos
- | Neumonía
- | Endocarditis estreptocócica

DOSIS


ADULTOS:

12-24 millones de unidades al día, divididas en dosis cada 4-6 horas

NIÑOS:

100,000-300,000 unidades/kg al día, divididas en dosis cada 4-6 horas

CESAR FELIPE
MORALES
SOLIS
4-A
POKEDEX
MEDICAMENTOS
TERAPIA
FARMACOLOGICA





007

AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO

se usa para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, infecciones en los oídos, pulmones, senos, piel y vías urinarias.

PRESENTACION

1 Caja, 1 Frasco(s), 10, 12, 16 Tabletas, 500/125 mg/mg

1 Caja, 1 Frasco(s), 6, 10, 12 Tabletas, 875/125 mg/mg

FIGHT

DRAGON

CONTRAINDICACIONES:

- Alergia a Penicilinas o Cefalosporinas
- Mononucleosis Infecciosa o Leucemia Linfática

MECANISMO DE ACCION:

- Inhibición de la síntesis de la pared celular
- Inhibición de las betalactamasas

REACCIONES ADVERSAS:

- Diarrea, náuseas, vómito
- prurito, urticaria, fiebre
- Leucopenia, trombocitopenia, agranulocitosis y eosinofilia.

INDICACIONES:

Infecciones de:

- Tracto Respiratorio Superior e inferior
- Bucodentomaxilares
- Tracto Urinario
- Piel y tejidos blandos

DOSIS

Adultos y Niños mayores de 12 años:

- Infecciones leves a moderadas: 500 mg/125 mg cada 12 horas.
- Infecciones graves: 875 mg/125 mg cada 12 horas o 500 mg/125 mg cada 8 horas.

CESAR FELIPE
MORALES
SOLIS
4-A
POKEDEX
MEDICAMENTOS
TERAPIA
FARMACOLOGICA





008 Ampicilina

Se usa para tratar infecciones bacterianas como meningitis, y de garganta, senos nasales, pulmones, órganos reproductivos, tracto urinario y gastrointestinal.



PRESENTACION

Ampicilina 500 mg y 1 g
Agua inyectable, 2, 4 y 5 ml.

Suspensión oral:
Ampicilina 250 mg
en 5 ml.

BUG

GHOST

CONTRAINDICACIONES:

- hipersensibilidad a cualquier penicilina
- Durante el embarazo y lactancia materna
- Pacientes sensibles a cefalosporinas.
- Pacientes con mononucleosis infecciosa

MECANISMO DE ACCION:

- Actúa inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular, lo que ocasiona la lisis y muerte de la Bacteria

REACIONES ADVERSAS:

- Glositis, Estomatitis, vómito
- Náusea, Enterocolitis
- Colitis pseudomembranosa, Diarrea
- Prurito, urticaria, eritema puniforme
- anemia, trombocitopenia

INDICACIONES:

- Infecciones de:
- Tracto Respiratorio Superior e inferior
 - Bucodontomaxilares
 - Tracto Urinario
 - Piel y tejidos blandos

DOSIS

Adultos:

- Adultos: 500 mg cada 6 horas.

Niños: de 1 a 3 años: 125 mg cada 6 horas.

Niños : de 3 a 6 años: 250 mg cada 6 horas

CESAR FELIPE
MORALES
SOLIS
4-A
POKEDEX
MEDICAMENTOS
TERAPIA
FARMACOLOGICA





009 Carbenicilina.

Es un medicamento B lactamico de alto espectro correspondiente al grupo de las Carboxipenicilinas principalmente utilizado por su actividad antimicrobiana contra pseudomonas

PRESENTACION

I.V 1g de Carbenicilina.

ROCK

GHOST

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad
- Hipertensión y alteraciones cardíacas.
- Insuficiencia Renal.
- Edema y Ascitis.

MECANISMO DE ACCION:

- Actúa inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular, lo que ocasiona la lisis y muerte de la Bacteria

REACIONES ADVERSAS:

- Anafilaxia.
- Aumento de Transaminasas.
- Alteraciones Hematológicas.
- Hipocalcemia.
- Diarrea, Náuseas y Vómitos..
- Cefalea y Mareos.

INDICACIONES:

- Sepsis.
- Infecciones Nosocomiales.
- Infecciones de diferente localización.
- Quemados severos.

DOSIS

- Adultos 5-6 gr cada 4-6 hrs.
- Niños 25-100 mg /kg cada 4-6 hrs

CESAR FELIPE
MORALES
SOLIS
4-A
POKEDEX
MEDICAMENTOS
TERAPIA
FARMACOLOGICA





010 Ciprofloxacino

Se usa para tratar o prevenir infecciones bacterianas como neumonía, gonorrea, fiebre tifoidea, diarrea infecciosa, e infecciones de piel, huesos, articulaciones, abdomen y próstata.

PRESENTACION

- Caja de cartón con 6, 8, 10, 12, 14 o 28 tabletas con 500 mg en envase de burbuja.
- Caja de cartón con 8 o 12 tabletas con 250 mg en envase de burbuja.

ROCK

GHOST

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula
- embarazo
- lactancia
- menores de 18 años.

MECANISMO DE ACCION:

- Inhibe las topoisomerasas II y IV, necesarias para la replicación, transcripción, reparación y recombinación del ADN bacteriano.

REACIONES ADVERSAS:

- náuseas, vómito, diarrea
- cefalea, mareos, somnolencia
- prurito, erupción cutánea
- eosinofilia, leucopenia, trombocitopenia.

INDICACIONES:

- Sepsis.
- Infecciones Nosocomiales.
- Infecciones de diferente localización.
- Quemados severos.

DOSIS

- Infecciones osteoarticulares, neumonías, infección de piel y tejidos blandos: 500 a 750 mg cada 12 horas vía oral por 7 a 14 días
- Diarrea bacteriana, 500 mg cada 12 horas por vía oral de 5 a 7 días





011 Paracetamol

un analgésico y antipirético eficaz para el control del dolor leve o moderado



PRESENTACION

- 500 y 750 mg caja con 10 o 20 tabletas
- jarabe de 3.2g/100ml

GROUND

FAIRY

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad
- Insuficiencia hepática grave
- hepatitis vírica

MECANISMO DE ACCION:

- Interrupción del proceso de conversión del ácido araquidónico en las membranas celulares inhibiendo las enzimas ciclooxigenasas

REACIONES ADVERSAS:

- Hipotensión
- Hepatotoxicidad
- Erupción cutánea
- hipoglucemia
- Piuria estéril


INDICACIONES:

- Fiebre y dolor leve o moderado
- Dengue
- Zika
- Cefalea de IRA

DOSIS

- Menor a 12 años: 500-650 mg/4-6 h máx. 4g/día
- pediátrica; 10-15 mg/kg/día

CESAR FELIPE
MORALES
SOLIS
4-A
POKEDEX
MEDICAMENTOS
TERAPIA
FARMACOLOGICA





012 Ibuprofeno

un analgésico y antipirético eficaz para el control del dolor leve o moderado

PRESENTACION

- Tabletas con 200, 400, 600 y 800 mg
- Pediatrica suspencion 40 mg/1ml y 2 g/100 ml

POISON

ICE

CONTRAINDICACIONES:

- Gastritis o úlcera péptica, Embarazo o lactancia materna
- Hipersensibilidad
- Enf. Hepática avanzada
- Dengue, trombocitopenia, Sangrado activo

MECANISMO DE ACCION:

- Interrupción del proceso de conversión del acido araquidónico en las membranas celulares inhibiendo las enzimas ciclooxigenasas

REACIONES ADVERSAS:

- Úlcera péptica
- perforación
- Nauseas, vomito, mareos
- Melena
- cefalea, vertigo, dispepsia

INDICACIONES:

- Artritis reumatoide
- Artrosis, dismenorrea
- Amigdalitis
- Calculo renal
- Tendinitis

DOSIS

- en adultos es de 400 a 800 mg vía oral cada 6 a 8 horas
- Antipiretico y analgesico en mayores de 3 meses: 5-7 mg/kg/dosis c/6 u 8 horas



CESAR FELIPE
MORALES
SOLIS
4-A
POKEDEX
MEDICAMENTOS
TERAPIA
FARMACOLOGICA



013 Naproxeno

se usa para reducir la fiebre y aliviar los dolores leves por cefaleas, dolores musculares, artritis, periodos menstruales, resfriado común; dolor de muelas y dolor de espalda



PRESENTACION

- Tabletas de 250, 275, 500 y 550 mg
- Pediátrica: suspensión 2.5 gr en 100 ml

POISON

ICE

CONTRAINDICACIONES:

- Gastritis o úlcera péptica, Embarazo o lactancia materna
- Hipersensibilidad, dengue
- Enf. Hepática avanzada
- Dengue, trombocitopenia, Sangrado activo

MECANISMO DE ACCION:

- Interrupción del proceso de conversión del ácido araquidónico en las membranas celulares inhibiendo las enzimas ciclooxigenasas

REACIONES ADVERSAS:


- Úlcera péptica
- perforación
- Náuseas, vomito, mareos
- Melena
- cefalea, vertigo, dispepsia

INDICACIONES:

- Artritis reumatoide
- Artrosis, dismenorrea
- Amigdalitis
- Calculo renal
- Tendinitis

DOSIS

- Analgésico: mayores de 2 años: 5-7mg/kg/dosis c/6-8 hrs
- Antiinflamatorio: 10-20 mg/kg/día c/6.8 hrs





014 Ketorolaco

AINE de la familia de los ácidos arilacéticos, utilizado principalmente por sus potentes propiedades analgésicas para aliviar el dolor moderado a severo en diversas situaciones clínicas.



PRESENTACION

- Tabletas 30 mg
- Ampolletas 30 mg/ml

FIRE

FAIRY

CONTRAINDICACIONES:

- Úlcera péptica activada
- Antecedente de ulceración
- Asma
- Insuficiencia cardíaca grave
- Hipovolemia

MECANISMO DE ACCION:

- Interrupción del proceso de conversión del ácido araquidónico en las membranas celulares inhibiendo las enzimas ciclooxigenasas

REACIONES ADVERSAS:

- Irritación GI
- Sangrado
- Ulceración y perforación
- Náusea, diarrea, cefalea
- Vértigo, sudoración, edema

INDICACIONES:

- Dolor moderado o severo en posoperatorio
- Dolor por cólico nefrótico

DOSIS

- Dosis en adultos: 90 mg máx
- Oral: 10mg/4-6 hrs max 40 mg/día

CESAR FELIPE
MORALES
SOLIS
4-A
POKEDEX
MEDICAMENTOS
TERAPIA
FARMACOLOGICA





015 Metamizol

Antiinflamatorio no esteroideo (AINE) derivado de la pirazolona. Como tal, inhibe la síntesis de las prostaglandinas.



PRESENTACION

- Ampolleta, 2 ml, 1 gramo
- ampolleta, 5 ml, 2.5 gramos
- ampolleta, 5ml, 2.5 gramos

FIRE

FAIRY

CONTRAINDICACIONES:

- hipersensibilidad a las pirazolonas
- deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa
- insuficiencia hepática
- porfiria hepática, agranulocitosis, nefritis, hepatitis
- Durante el embarazo y la lactancia.

MECANISMO DE ACCION:

- Interrupción del proceso de conversión del ácido araquidónico en las membranas celulares inhibiendo las enzimas ciclooxigenasas

REACIONES ADVERSAS:

- erupción cutánea
- urticaria
- prurito
- asma, sudoración fría, disnea y asma

INDICACIONES:

- Dolor posoperatorio o postraumático tipo cólico, fiebres graves y resistentes

DOSIS

- La dosis recomendada para adultos es de 500 mg a 1 g por vía oral cada 6-8 horas sin exceder de 4 g al día.

CESAR FELIPE
MORALES
SOLIS
4-A
POKEDEX
MEDICAMENTOS
TERAPIA
FARMACOLOGICA



CESAR FELIPE
MORALES
SOLIS
4-A
POKEDEX
MEDICAMENTOS
TERAPIA
FARMACOLOGICA



016 Propanolol

betabloqueantes Su acción consiste en relajar los vasos sanguíneos y desacelerar el ritmo cardíaco

PRESENTACION

- Envase conteniendo 20 comprimidos.

BUG

ICE


CONTRAINDICACIONES:

- Asma bronquial
- Enfermedad bronquial obstructiva
- insuficiencia cardíaca
- Uso asociado a IMAO

MECANISMO DE ACCION: <ul style="list-style-type: none">• Antagonista competitivo de receptores β_1 y β_2 - adrenérgicos, sin actividad simpaticomimética intrínseca.	REACIONES ADVERSAS: <ul style="list-style-type: none">• depresión mental• bradicardia• disminución de la capacidad sexual• diarrea y mareos.	INDICACIONES: <ul style="list-style-type: none">• Dolor moderado o severo en posoperatorio• Dolor por cólico nefrótico
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSIS

- Adultos: 10 - 80 mg/dosis.
- Niños: 0.5 - 2 mg/kg/día.
- Dosis cada 8 - 24 horas.



CESAR FELIPE
MORALES
SOLIS
4-A
POKEDEX
MEDICAMENTOS
TERAPIA
FARMACOLOGICA



017 Nifedipino

betabloqueantes Su acción consiste en relajar los vasos sanguíneos y desacelerar el ritmo cardíaco

PRESENTACION


- Envase conteniendo 20 comprimidos.

BUG

ICE

CONTRAINDICACIONES:

- Asma bronquial
- Enfermedad bronquial obstructiva
- insuficiencia cardíaca
- Uso asociado a IMAO



<p>MECANISMO DE ACCION:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bloquean canales de Ca^{2+} voltaje-dependientes 	<p>REACIONES ADVERSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrífinimiento • Mareos • Vertigo • Taquicardias • Tos, Diarreas 	<p>INDICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enfermedad de las arterias coronarias Angina • Arritmias Afecciones de los vasos sanguíneos, como la enfermedad de Raynaud
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSIS

10 ó 20 mg cada 6 a 8 horas.



CESAR FELIPE
MORALES
SOLIS
4-A
POKEDEX
MEDICAMENTOS
TERAPIA
FARMACOLOGICA



018 Captopril

Medicamento que se usa para tratar la hipertensión



PRESENTACION

- Cajas con 15 o 30 tabletas de 25 mg.
- Cajas con 15 o 30 tabletas de 50 mg.

NORMAL

STEEL

CONTRAINDICACIONES:

- Pacientes hipersensibles a captopril u otro IECA. Embarazo en todo su curso. Lactancia.

MECANISMO DE ACCION:

- Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina

REACCIONES ADVERSAS:


- Neutropenia/agranulocitosis
- Hipotensión
- Angioedema
- Reacciones anafilactoides
- Tos

INDICACIONES:

- Hipertensión arterial moderada o grave.
- Insuficiencia cardiaca.
- Nefropatía crónica IAM
- Un accidente cerebrovascular

DOSIS

Se puede iniciar con 12.5 a 25 mg, dos a tres veces al día. La dosis más común es de 50 mg en dos o tres tomas iguales



CESAR FELIPE
MORALES
SOLIS
4-A
POKEDEX
MEDICAMENTOS
TERAPIA
FARMACOLOGICA



019 Losartan

El losartán potásico bloquea la acción de las sustancias químicas que hacen contraer (hacer más estrechos) los vasos sanguíneos



PRESENTACION

Caja con 15 o 30 comprimidos de 50 mg cada uno.

BUG

ICE

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de este producto, embarazo.

MECANISMO DE ACCION:

- ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE ANGIOTENSINA II

REACIONES ADVERSAS:

- Angioedema
- infiltrado linfocítico cutáneo atípico
- anemia
- erupción, urticaria, prurito, angioedema

INDICACIONES:

- Hipertensión
- insuficiencia cardíaca congestiva
- nefropatía.

DOSIS

dosis habitual es de 50 mg una vez al día. La dosis puede incrementarse, si es necesario, a 100 mg/día en forma de dosis única o dividida en 2 dosis.



CESAR FELIPE
MORALES
SOLIS
4-A
POKEDEX
MEDICAMENTOS
TERAPIA
FARMACOLOGICA



020 Hidralacina

El losartán potásico bloquea la acción de las sustancias químicas que hacen contraer (hacer más estrechos) los vasos sanguíneos

PRESENTACION

Envase
conteniendo 20
comprimidos.

FIGHT

GROUND

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de este producto, embarazo.

MECANISMO DE ACCION:

- Interfiere en la liberación de Ca²⁺ a partir del retículo sarcoplásmico en las células de la musculatura lisa vascular.

REACIONES ADVERSAS:

- Artralgias, entumecimiento, hormigueo, dolor o debilidad en manos o pies
- Rash, fiebre, dolor de garganta, edemas periféricos, diarreas, taquiarritmias, estreñimiento.

INDICACIONES:

- Hipertensión

DOSIS

50 a 200 mg/día, divididos en 2 ó 3 tomas.



BIBLIOGRAFÍA:

Doe, J. (2019). Efectos de la glibenclamida en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Revista de Medicina, 34(2), 123-130. náuseas, vómito, diarrea cefalea, mareos, somnolencia prurito, erupción cutánea eosinofilia, leucopenia, trombocitopenia

American Diabetes Association. (2020). Standards of Medical Care in Diabetes—2020 Abridged for Primary Care Providers. Clinical Diabetes, 38(1), 10-38.
<https://doi.org/10.2337/cd20-as01>

Brunton, L. L., Chabner, B. A., & Knollmann, B. C. (2011). Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics (12th ed.). McGraw-Hill.

Medicamentos PLM. (2024). "Medicamentos PLM". Recuperado el [fecha de acceso] de <https://www.medicamentosplm.com/>