



JUAN PABLO ABADIA LOPEZ

**DRA. ARELY ALEJANDRA AGUILAR
VELASCO**

MAPA

**PROPEDEUTICA, SEMIOLOGIA Y
DIAGNOSTICO FISICO**

PASIÓN POR EDUCAR

4

B

Comitán de Domínguez Chipas a 28 de Junio del 2024

SINTOMAS Y SIGNOS URINARIOS

DOLOR RENAL Y URETRAL

Dolor renal. Debido a la falta de inervación sensitiva de su parénquima el dolor renal es un síntoma poco frecuente, observándose solo en aquellas circunstancias en que se distiende la cápsula renal, ya sea por inflamación, infección, tumor u obstrucción crónica

Cólico uretral Se debe a la distensión aguda del sistema excretor renal: cálices, pelvis renal y, especialmente, uréter, por encima de una obstrucción parcial o total de este.

Dolor vesical. Una distensión aguda de la vejiga produce un dolor muy intenso hipogástrico, inicialmente acompañado de deseo imperioso, pero fallido, de orinar

SINTOMAS URINARIOS BAJOS

Disuria. En el sentido estricto, disuria es un término genérico que solo significa malestar en la micción.

Dolor miccional. Es aquel dolor que acompaña a la irritación o inflamación vesical o uretral de diversos orígenes y es percibido como dolor, ardor o quemadura durante la micción.

Polaquiuria. Es el término para referirse a micciones muy frecuentes y de escaso volumen; en casos severos, solo unas pocas gotas de orina cada pocos minutos.

Urgencia miccional. Necesidad imperiosa e inaguantable de orinar sin que la vejiga esté llena. En oportunidades, se acompaña de vaciamiento involuntario de pequeñas cantidades de orina.

Pujo o tenesmo vesical. Gana continua o frecuente de orinar, con gran dificultad de lograrlo y acompañada de dolores.

Incontinencia urinaria. Es la micción involuntario por incapacidad de retener la orina en la vejiga.

ALTERACIONES VOLUMEN URINARIO

Oliguria. Es la disminución del volumen urinario por debajo de 400 mL al día.

Anuria. Por costumbre, se denomina anuria al volumen urinario inferior a 100 mL/día y se reserva el nombre anuria total a la ausencia total de orina.

Poliuria. Se denomina poliuria a un volumen urinario aumentado por encima de 3.000 mL/día

Nicturia. Se denomina nicturia al aumento del número de micciones durante las horas de sueño

SEMIOLOGIA

Los siguientes elementos clínicos orientan al diagnóstico de cólico renal:

- Habitualmente es de inicio lumbar y de carácter cólico.
- Las fluctuaciones de intensidad duran habitualmente horas.
- El paciente muestra gran inquietud. busca diversas posiciones, a veces bizarras.
- Irradiación a genitales.
- Presencia de macro o microhematuria

Prerrenal. Cuando la causa de la reducción del volumen de orina es funcional, estando el riñón estructuralmente intacto.

Renal. Cuando la causa de la reducción del volumen urinario es por una alteración estructural renal parenquimatosa

Posrenal. En estos casos la oliguria o anuria se debe a obstrucción de la vía urinaria, sea por obstrucción del tracto de salida vesical (adenoma de próstata, cálculo, estenosis uretral, cáncer vesical o prostético)

