



**Nombre Del Alumno: Rashel Citlali
Rincón Galindo**

**Nombre Del Profesor: Arely Alejandra
Aguilar Velasco**

**Nombre Del Trabajo: Infografía Signos
y Síntomas**

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Propedéutica Semiología

Grado: 4

Grupo: "B"

SIGNOS Y SÍNTOMAS DIGESTIVOS

DOLOR ABDOMINAL




Ocurre entre el pecho y las regiones pélvicas. Es un dolor parecido a un cólico, fuerte, palpitante, intermitente o agudo



El dolor abdominal puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, constipación, gases, comer en exceso, estrés o distensión muscular.




DISPEPSIA



Malestar en la parte superior del abdomen que se describe como sensación de ardor, hinchazón o gaseosidad, náuseas o sensación de saciedad demasiado rápido al comenzar a comer.

La indigestión puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, comer o tomar demasiado, tomar pastillas con el estómago vacío o intolerancia a los alimentos.




NAUSEAS Y VÓMITOS



Las náuseas pueden tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, el movimiento de un auto o un avión, tomar pastillas con el estómago vacío, comer demasiado o muy poco, o tomar mucho alcohol.

Los problemas comunes que pueden causar náuseas y vómitos incluyen: Alergias a los alimentos. Infecciones estomacales o intestinales, como la "gastroenteritis vírica epidémica" o la intoxicación alimentaria.



La náusea es cuando se siente mal del estómago, como si fuera a vomitar. Vomitar es cuando devuelve el contenido del estómago por la boca.

DIARREA



La diarrea puede ser ocasionada por un virus o, a veces, comida contaminada. En casos menos frecuentes, puede ser el síntoma de otro trastorno, como la enfermedad intestinal inflamatoria o el síndrome del intestino irritable. Los síntomas incluyen heces blandas y líquidas, y dolor de vientre.

La mayoría de los casos desaparecen por sí solos. Algunas infecciones pueden necesitar antibióticos. Los casos graves pueden causar deshidratación suficiente como para requerir fluidos intravenosos.




La diarrea puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, dieta líquida, intolerancia a alimentos, estrés, ansiedad o uso de laxantes.

HEMORRAGIA DIGESTIVA



El sangrado gastrointestinal es un signo de un trastorno en el tracto digestivo. La sangre suele aparecer en las heces o el vómito, pero no siempre es evidente. Las heces podrían tener un tono negro o alquitranado. El sangrado puede variar de leve a intenso, y puede ser mortal.




Existen muchas causas posibles de hemorragia gastrointestinal, entre ellas se encuentran hemorroides, úlceras pépticas, desgarres o inflamación en el esófago, diverticulosis y diverticulitis, colitis ulcerativa o ulcerosa y enfermedad de Crohn, pólipos del colon o cáncer de colon, estómago o esófago.




ICTERICIA

Ictericia



Piel amarillenta ocasionada por la acumulación de bilirrubina en la sangre.

La ictericia puede ocurrir si el hígado no puede procesar de manera eficiente los glóbulos rojos a medida que descomponen. Es normal en recién nacidos sanos y por lo general desaparece por sí sola. En las personas de mayor edad, puede ser signo de infección o enfermedad hepática.



Los síntomas incluyen coloración amarillenta de la piel y la esclerótica de los ojos.

Algunos recién nacidos pueden necesitar fototerapia durante uno o dos días. En otros casos, el tratamiento consiste en ocuparse de la causa subyacente.