



Javier Adonay Cabrera Bonilla

Gerardo Cancino Gordillo

Imagenología

Cuadro (normalidad en la ecografía abdominal)



PASIÓN POR EDUCAR

4°

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas, a 25 de mayo del 2024.

Estudios ecográficos

Estudio	Dimensiones normales	Características ecográficas normales	Ilustración
Ecografía de hígado	<ul style="list-style-type: none"> -Diámetro longitudinal es inferior a 8-9 cm -Diámetro trasversal inferior a 3-4 cm -Vía biliar principal 6 mm 	<ul style="list-style-type: none"> -Ecoestructura homogénea -Ecos ligeramente hipoeoicos respecto al bazo -Más Hiperecogenica que la corteza renal -grano ecográfico fino 	
Ecografía de vesícula biliar y vías biliares	<ul style="list-style-type: none"> -Eje longitudinal menos a 10 cm -Eje trasversal menor a 4 cm -Grosor de pared es menor de 3 mm 	<ul style="list-style-type: none"> -Ecográficamente tiene forma ovalada -Mide en eje longitudinal < 10cm -En eje trasversal < 4cm -El grosor normal de su pared es < 3mm -Puede presentar variaciones en la forma, localización o número (pliegues, septos, localización intrahepática, duplicaciones o agenesias) 	

<p>Ecografía pancreática</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Cabeza: < 30 mm -Cuerpo: < 20 cm -Cola: < 25 cm -Conducto de Wirsung: 2-3 mm 	<ul style="list-style-type: none"> -La eco estructura es homogénea o discretamente heterogénea La ecogenicidad es igual o ligeramente mayor que la hepática -Siendo frecuente encontrar páncreas hiperecogénicos en pacientes obesos Tiene forma de coma -Con un diámetro longitudinal que oscila entre 12,5 y 20cm -Se divide en cabeza, proceso uncinado, cuello o istmo, cuerpo y cola. -Los diámetros anteroposteriores presentan gran disparidad entre los distintos valores publicados, variando entre 2,5 y 4cm 	
<p>Ecografía renal</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Diámetro longitudinal: 9-13 cm (diferencia normal máxima entre ambos de 15 mm) - Espesor parietal (parenquimatoso): 10-20 mm Pelvis renal: -Normal: < 10 mm 	<ul style="list-style-type: none"> -Ambos riñones mantengan las características ecográficas normales (tamaño renal, buena diferenciación corticomedular, grosor parenquimatoso conservado - ausencia de masas, litiasis y dilatación del sistema excretor 	

Ecografía esplénica

-Diámetro: < 130 x 60 x 90 mm (L x AP x T)

Vena esplénica:

- Diámetro normal (se mide a nivel del páncreas): < 7 mm

-Presenta una forma triangular,
-parénquima es homogéneo
-con una ecogenecidad uniforme similar o discretamente menor a la del hígado

