Brian Torres Villalobos

Dr Martín Pérez Durán

Mapas

Terapia Farmacologica

4º "C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de Abril de 2024

Vías de administración

- **Sublingual**
  - Epitelio muy vaszularizado
    - Mucosa
    - Base de la lengua

- **Oral**
  - Via más común
    - Sufre efecto del primer paso
  - Absorción en estomago e intestino

- **Rectal**
  - zona muy irrigada
    - Absorción irregular
  - Farmacos destruidos por ph

- **Respiratoria**
  - Absorción por difusión simple
    - Uso de nebulizador y aerosol



- **Dermica**
  - Absorción lenta
  - Local



- **Genitourinario**
  - Funcion uretral o vaginal

- **Subcutanea**
  - permite tener mayor control de la cantidad del farmaco utilizable

- **Intramuscular**
  - Absorcuón rapida y regular
  - Mayor utilidad del farmaco
  - Mayor acción



- **Intravascular**
  - Directo a torrente sanguineo
  - Efecto rapido



- **Intraósea**
  - Vía de acceso facil, rapida y eficaz en el sistema vascular

Presented with xmind

Presentación de fármacos

Sólidos

- **Capsulas** — Principios activo recubierto por capa gelatinosa

- **Comorimido** — mezcla de principios activos y excipientes

- **Pastillas** — Pequeñas y solidas

- **Pildoras** — Sinónimo de pastillas o capsulas referente al tamaño

- **Ovulos** — Diseñada para see insertada en via vaginal o rectal

Semi sólidos

- **Pomadas** — Se aplican sobre la piel o mucosas de forma local

- **Cremas** — Emulsión semisolida para tx local

liquidos

- **Soluciones** — Disuelto en un solvente

- **Suspensión** — Suspendido en un liquido y deve er necesario agitar para usar

- **Jarabe** — Contienen de uno a varios principios activos generalmente dulces

- **Inyectable** — Administración de medicamentos liquidos mediante una aguja

Presented with xmind