



**Universidad del sureste.**

Campus Comitán De Dominguez, Chiapas.

Medicina Humana.



## **Glosario de terminología médica y formato de historia clínica.**

**Nombre del alumno:**

Diana Rocío Gómez López

**Nombre del profesor:**

Dra. Rosvani Margine Morales Irecta.

**Parcial:** 1er. Parcial.

**Semestre:** 4to. Semestre. 4to. D

**Nombre de la Materia:**

Propedéutica, semiología y diagnóstico físico.

Sábado 16 de marzo del 2024.

## Historia clínica.

### Identificación.

**Nombre(s):**

**Edad:**

**Fecha de nacimiento:**

**Sexo:**

**Nacionalidad:**

**Lugar de origen:**

**Residencia:**

**Idioma / lenguaje:**

**Etnia:**

**Religión:**

**Escolaridad:**

**Estado civil:**

**# teléfono:**

**Responsable / tutor:**

**Tipo de interrogatorio:**

**Fecha, hora de ingreso:**

**Egreso:**

**Antecedentes heredofamiliares.**

**Antecedentes no patológicos personales.**

**Antecedentes personales patológicos.**

**Antecedente gineco-obstétricos.**

**Interrogatorio por aparatos y sistemas.**

◇ **Sistema locomotor.**

◇ **Sistema nervioso.**

◇ **Sistema endocrino.**

◇ **Piel.**

- ◇ **Aparato respiratorio.**
  
- ◇ **Aparato cardiovascular.**
  
- ◇ **Aparato digestivo.**
  
- ◇ **Aparato urinario.**
  
- ◇ **Aparato genital.**

## GLOSARIO DE TERMINOLOGÍAS MÉDICAS

### SISTEMA CARDIOVASCULAR

- ◇ **Acúfenos:** Es la percepción de sonidos en ausencia de estímulos auditivos externos.
- ◇ **Acufenos intrínsecos:** están propiciados por causas endógenas y solo el paciente los percibe
- ◇ **Anasarca:** hinchazón general de todo el cuerpo que puede ocurrir cuando los tejidos del organismo retienen demasiado líquido.
- ◇ **Ascitis:** Es la presencia de líquido en el espacio peritoneal en íntimo contacto con sus dos hojas, visceral y parietal
- ◇ **Cefalalgia:** Dolor que se percibe por encima del cuello, o bien toda sensación dolorosa que aparece en cualquier parte del cráneo, desde la nuca hasta la región orbitaria.
- ◇ **Cianosis:** Es la coloración Azul violeta , gris o púrpura de la piel y/o mucosas.
- ◇ **Claudicación intermitente:** Es un síndrome integrado por dolor, parestesias y/o impotencia motora, o mezcla de los tres fenómenos en uno o en ambos miembros pélvicos
- ◇ **Disnea:** sensación de dificultad para respirar en la que el paciente siente necesidad de aumentar el esfuerzo respiratorio
- ◇ **Edema:** Es el aumento o exceso de líquido en el espacio intersticial y/o en las cavidades orgánicas, puede ser un exudado o un trasudado
- ◇ **Espujo:** Es el material biológico procedente de los pulmones, bronquio o tráquea (árbol respiratorio), expulsado por la boca a través del mecanismo de la tos o la expectoración.
- ◇ **Expectoración:** Es el acto de arrojar por la boca las flemas y secreciones que se depositan en la nariz, laringe, tráquea y bronquios
- ◇ **Fosfenos:** Son sensaciones luminosas en ausencia de estímulos externos.
- ◇ **Frote pericárdico:** Son ruidos cardiacos añadidos de tono alto, provocados por el frote de las hojas pericárdicas

- ◇ **Galope:** Es un ritmo en tres tiempos. Provocado por la presencia de un tercer ruido que se suma a los dos habituales
- ◇ **Hemoptisis:** Es la expulsión de sangre procedente de las vías respiratorias, siendo esta, roja, rutilante, fresca y espumosa o aireada.
- ◇ **Ingurgitación venosa de la yugular:** Es el aumento de volumen y consistencia de la vena yugular, por arriba de 4 centímetros de agua, debido a una acumulación de sangre
- ◇ **Palpitaciones:** Es una manifestación común en la que el paciente percibe el latido apexiano. Puede ser rápido, a veces lento, regular o irregular.
- ◇ **Soplo:** Son ruidos anómalos acústicos, que aparecen durante el ciclo cardiaco, debido a la presencia de flujo sanguíneo turbulento
- ◇ **Thrill:** sensación percibida por la mano que palpa, o bien es la sensación táctil que produce la corriente sanguínea al pasar con cierta intensidad por los orificios valvulares
- ◇ **Tos:** Es la expulsión espiratoria explosiva y ruidosa de aire procedente de las vías respiratorias

#### APARATO DIGESTIVO.

- ◇ **Acedías:** Es el eructo con sabor y olor a huevo podrido, pútrido, agrio, descompuesto y/o desabrido
- ◇ **Acolia:** Es la coloración blanca o de color arcilla de la materia fecal por ausencia de los pigmentos biliares.
- ◇ **Hipocolia:** Las heces presentan un color pálido por disminución de los pigmentos biliares.
- ◇ **Hipercolia:** Son las heces con una coloración café oscura, por aumento en la excreción de urobilinógenos y urobilinas fecales, como sucede en las ictericias de origen hemolítico
- ◇ **Agruras:** Es la sensación de agrio, de acidez, de ardor o dolor urente localizado en la orofaringe
- ◇ **Anorexia:** Trastorno de la alimentación, que se caracteriza por la ausencia de hambre, en presencia de la necesidad fisiológica de ingerir alimento

- ◇ **Hiporexia:** Es un trastorno alimentario caracterizado por la disminución del apetito
- ◇ **Ascitis:** Es la presencia de líquido en el espacio peritoneal en íntimo contacto con sus dos hojas, visceral y parietal
- ◇ **Asterixis:** es un temblor aleteante caracterizado por movimientos rápidos (frecuencia de 4 a 10 s), bruscos, irregulares, desordenados, bilaterales, de flexión y extensión en las articulaciones de la muñeca y metacarpofalángicas, existe pérdida del tono postural, con incapacidad para mantener la actitud.
- ◇ **Borborigmos:** Es la percepción de ruidos tintineantes como resultado de una perístasis hiperactiva, son sonidos procedentes del intestino, audibles por el paciente y a veces por el médico.
- ◇ **Bruxismo:** hábito para funcional durante los movimientos protrusivos y laterales de la mandíbula, sin propósitos funcionales de apretar y frotar y/o rechinar los dientes.
- ◇ **Diarrea:** presencia de tres o más evacuaciones que tengan disminución de la consistencia y aumento de la frecuencia.
- ◇ **Disfagia:** dificultad que se presenta durante la deglución y puede ser transitoria o permanente
- ◇ **Dolor abdominal:** Es la sensopercepción desagradable localizada en el abdomen.
- ◇ **Dolor ano rectal:** Es la sensopercepción desagradable, localizada en la región anal, perianal, perineal y coccígea
- ◇ **Eructo:** es la expulsión por la boca, por lo general de manera ruidosa, de gas proveniente de esófago y/o estómago
- ◇ **Estreñimiento o constipación:** Es el retardo en la evacuación normal y periódica de las heces, siendo la defecación de poco volumen, infrecuente y/o molesta, las heces tienen una resequedad excesiva y un volumen insuficiente
- ◇ **Flatulencia:** Es la expulsión de gas por vía anal.
- ◇ **Halitosis:** Es el aliento con olor desagradable o mal olor del aliento.

- ◇ **Hematemesis:** Es el vómito de sangre proveniente del aparato digestivo, puede ir acompañado de jugo gástrico y/o restos alimentarios, la sangre puede ser roja o negra y no es espumosa.
- ◇ **Incontinencia anal:** pérdida del control voluntario de la defecación o bien la incapacidad para controlar la eliminación del contenido rectal, hasta que su expulsión sea socialmente aceptable.
- ◇ **Melena:** Es la expulsión de heces alquitranadas, de olor fétido, con aspecto untuoso, brillante, acompañadas de moco y son fétidas.
- ◇ **Meteorismo:** Es el aumento de la tensión o el volumen del abdomen por acumulación de gases en el intestino
- ◇ **Náusea:** Se describe como una sensación vaga, desagradable y repulsiva que se experimenta en la región epigástrica.
- ◇ **Odinofagia:** Es el dolor que se presenta a la ingestión o deglución de los alimentos
- ◇ **Pirosis:** Es la sensación de ardor o quemadura localizada en la región retroesternal o en la región epigástrica alta y en ocasiones puede ascender hasta la orofaringe.
- ◇ **Prolapso rectal:** descenso anormal de la mucosa del recto (incompleto) con salida o no a través del orificio anal
- ◇ **Prurito anal:** Es la sensación de picazón o escozor que obliga al rascado de la región anal y área circundante
- ◇ **Ptialismo:** Es el aumento en la secreción de saliva por arriba de 1 500 ml
- ◇ **Sialorrea:** escurrimiento de la saliva a través de las comisuras bucales, la lengua y los labios.
- ◇ **Pujo rectal:** es el dolor cólico rectosigmoideo que se origina en la fosa iliaca izquierda en sentido descendente hacia la región anal.
- ◇ **Rectorragia:** Es la presencia de sangre color rojo brillante (sangre fresca a través del ano, aislada o junto con las heces
- ◇ **Regurgitación:** Es el regreso a la cavidad oral de pequeñas cantidades de contenido gástrico o esofágico por medio de movimientos antiperistálticos, sin acompañarse de náusea y arqueo.

- ◇ **Tenesmo rectal:** Es el impulso repetitivo e inefectivo de defecar o la incapacidad de la musculatura rectal de expulsar su contenido
- ◇ **Emesis:** Es la expulsión del contenido gástrico a través de la cavidad oral de manera violenta acompañado de arqueos

#### APARATO RESPIRATORIO.

- ◇ **Aleteo nasal:** Es la dilatación anómala de las narinas.
  - ◇ **Cianosis:** Es la coloración azul violácea, gris o púrpura de la piel y/o mucosas.
  - ◇ **Disfonía:** es la alteración de las propiedades acústicas de la voz.
  - ◇ **Afonía:** pérdida de la voz
  - ◇ **Disnea:** sensación de dificultad para respirar en la que el paciente siente necesidad de aumentar el esfuerzo respiratorio
  - ◇ **Dolor torácico:** Es cualquier sensopercepción desagradable localizada en el tórax por encima del diafragma.
  - ◇ **Epistaxis:** Es la salida de sangre proveniente de las fosas nasales, pero en algún momento dado puede ser expulsada por la boca.
  - ◇ **Estertores:** Son ruidos anormales que se encuentran durante el ciclo respiratorio.
  - ◇ **Hemoptisis:** Es la expulsión de sangre procedente de las vías respiratorias, siendo esta, roja, rutilante, fresca y espumosa o aireada.
- Rinorrea:** Es el flujo aumentado de origen nasal o salida de líquido por la fosa nasal.
- ◇ **Tiros:** Es la retracción de los tejidos blandos por el esfuerzo muscular, debido generalmente a una dificultad respiratoria para mantener un intercambio de gases compatible con la vida, es un signo de dificultad respiratoria.
  - ◇ **Tos:** Es la expulsión espiratoria explosiva y ruidosa de aire procedente de las vías respiratorias
  - ◇ **Vómica:** Es la expulsión brusca y masiva por la boca e incluso por la nariz de una cantidad grande de pus o líquido, proveniente de vías respiratorias, se realiza a bocanadas con golpes violentos de tos, incluso puede haber asfixia.

## APARATO UROGENITAL

- ◇ **Anuria:** Es la ausencia absoluta de eliminación de orina sin presencia de orina en la vejiga
- ◇ **Criptorquidia:** Es la ausencia del testículo en su posición escrotal normal, aunque la gónada sea palpable y no esté oculta.
- ◇ **Dispareunia:** Es el dolor que se presenta durante el coito sin que exista obstáculo alguno que se oponga a su realización
- ◇ **Disuria.** Es la micción desagradable, molesta y dolorosa o el dolor urente que se presenta durante la micción
- ◇ **Edema:** Es el aumento o exceso de líquido en el espacio intersticial y/o en las cavidades orgánicas, puede ser un exudado o un trasudado
- ◇ **Epispadias.** Es la presencia del meato uretral en la cara dorsal o inferior del pene
- ◇ **Escurrimiento uretral:** Es la salida de secreciones patológicas a través de la uretra, por lo que se excluyen orina y semen
- ◇ **Fimosis.** una condición en la cual no puede retraerse el prepucio de manera manual y lograr su descenso por detrás del surco balanoprepucial, sobre el glande
- ◇ **Hematocele.** Es la presencia de sangre dentro la túnica serosa vagina
- ◇ **Hematuria** eliminación de orina mezclada con sangre
- ◇ **Hidrocele.** colección de líquido entre la capa visceral y la capa parietal de la túnica vaginalis del escroto, de consistencia blanda o muy tensa y el líquido es claro o amarillo (
- ◇ **Hipospadias.** alteración congénita, en la que el orificio uretral s
- ◇ **Incontinencia urinaria.** Es la salida o pérdida involuntaria de orina por incapacidad de la vejiga para retener la orina
- ◇ **Nicturia.** inversión del ritmo urinario normal, de manera que la orina emitda durante la noche es mayor es mayor que la emitda durante el día
- ◇ **Piuria.** Es la expulsión de pus mezclado con la orina

- ◇ **Polaquiuria.** Es el aumento en el número de micciones, cada micción es en escasa cantidad, por lo que no se altera el volumen urinario emitido en 24 horas
- ◇ **Poliuria.** Es el aumento en la excreción de orina emitida en 24 horas, mayor de 2 a 3 litros (
- ◇ **Tenesmo vesical.** es la sensación de no haber vaciado la vejiga después de la micción aparentemente llevada hasta el final
- ◇ **micción.** Es la necesidad imperiosa de evacuar el contenido vesical
- ◇ **Varicocele.** es dilatación y tortuosidad de las venas del plexo pampiniforme del cordón espermático

#### ◇ SISTEMA ENDOCRINO.

- ◇ **Ansiedad:** Es una reacción subjetiva ante una amenaza real o imaginaria, caracterizada por una sensación inespecífica de desasosiego
- ◇ **Astenia:** Es la sensación de debilidad generalizada con fatiga fácil, laxitud y la falta o disminución de la fuerza muscular o energía, con el deseo intenso de permanecer acostado.
- ◇ **Polidipsia:** Es la sensación excesiva de sed
- ◇ **Polifagia.** Se define como hambre voraz o excesiva, aumento en la ingesta de alimentos, o sensación persistente de querer ingerir alimento
- ◇ **Apetito.** Es el deseo de ingerir un tipo de alimento en especial
- ◇ **Poliuria.** Es el aumento en la excreción de orina emitida en 24 horas, mayor de 2 a 3 litros.
- ◇ **Somnolencia:** Es la tendencia a quedarse dormido, propensión al sueño o la habilidad de transición de la vigilia al sueño, existiendo un gran deseo de dormir con dificultad para permanecer despierto en horas en que habitualmente no debiera suceder así.

#### SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO.

- ◇ **Deformidad.** Es la alteración de la forma de una extremidad o región o forma anormal del miembro o tronco afecto.
- ◇ **Disfunción.** Es la incapacidad persistente para lograr o sostener
- ◇ **Equimosis.** , la equimosis se define como una mancha producida por la extravasación de sangre intradérmica, en el tejido celular subcutáneo subyacente o en ambos.

## SISTEMA NERVIOSO.

Alteraciones de la coordinación muscular.

- ◇ **Asinergia:** Es la falta de cooperación muscular para efectuar movimientos voluntarios.
- ◇ **Disdiadococinesia:** Es la dificultad para realizar movimientos alternantes de pronación y supinación.
- ◇ **Dismetría:** Es la pérdida de la medida exacta en la ejecución de los movimientos.
- ◇ **Pérdida del control de la musculatura antagonista:** Los músculos que se oponen al movimiento de los músculos agonistas han perdido su función.

Alteraciones de la movilidad.

- ◇ **Paresia.:** disminución de la fuerza de los músculos con limitación del rango de movimientos voluntarios.
- ◇ **Monoparesia.** déficit motor aislado en una extremidad, superior o inferior,
- ◇ **Diparesia.** Las personas con esta forma tienen principalmente rigidez en los músculos de las piernas
- ◇ **Paraparesia.** parcialmente incapaz de mover las piernas
- ◇ **Parálisis.** Detención de cualquier actividad, funcionamiento o proceso
- ◇ **Monoplejía.** parálisis limitada a una extremidad o área del cuerpo
- ◇ **Paraplejía.** parálisis limitada a una extremidad o área del cuerpo
- ◇ **Parestesia:** Es una alteración de la sensibilidad, proviene del griego para: peor y **aisthesis:** sensibilidad, en la que el paciente refiere sentir pinchazos, sensación de frío o calor o bien adormecimiento, en ausencia de estímulo externo

- ◇ **Hiperestesia:** Aumento de la sensibilidad al tacto grueso, dolor y temperatura
- ◇ **Hipoestesia:** Disminución de la sensibilidad al tacto grueso, dolor y temperatura.
- ◇ **Anestesia:** Pérdida de la sensibilidad al tacto grueso, dolor y temperatura.
- ◇ **Hiperalgesia:** Aumento de la sensibilidad al dolor.
- ◇ **Hipoalgesia:** Disminución de la sensibilidad dolorosa.
- ◇ **Analgesia:** Pérdida de la sensibilidad al dolor.
  
- ◇ **Afasia:** Es la pérdida de la capacidad de expresión por medio de la palabra o la escritura y/o de la capacidad de comprensión del lenguaje hablado o escrito, debido a lesión o enfermedad de las áreas cerebrales que integran el lenguaje.
- ◇ **Agnosia:** dificultad o incapacidad de reconocer los estímulos presentados por vías aferentes cerebrales, en individuos que tengan preservadas la vigilia, conciencia, comprensión, funciones motoras y sensoriales.
- ◇ **Alucinación:** Son percepciones sensoriales falsas, cuya característica es que se presentan en ausencia de algún estímulo externo.
- ◇ **Amnesia:** pérdida de la memoria que puede ser parcial o total
- ◇ **Apraxia:** Incapacidad para efectuar actos, más o menos automáticos con una finalidad determinada, sin que sean atribuidos a paresia, ataxia, afasia y/o agnosia
- ◇ **Hipoprosia o aprosia.:** Es la disminución o pérdida de la atención.
- ◇ **Hiperprosa:** Es el aumento patológico de la atención, caracterizado porqué el paciente pone su atención en varios objetos a la vez.

Alteraciones de los reflejos al estiramiento muscular.

- ◇ **Arreflexia:** Es la abolición de los reflejos.
- ◇ **Hiporreflexia.:** Disminución de la respuesta de los reflejos.
- ◇ **Hiperreflexia:** Es aumento de la respuesta de los reflejos.
- ◇ **Inversión del reflejo:** Es la respuesta invertida del reflejo.
- ◇ **Reflejos patológicos:** Es la aparición de reflejos que normalmente no existen.
- ◇ **Reflejo poliginético:** En la hiperreflexia no se produce una sola sacudida como respuesta, sino varias sacudidas sucesivas.

- ◇ **Difusión del reflejo o del estímulo:** El reflejo se presenta estimulando más allá del sitio habitual para obtenerlo.
- ◇ **Reflejo pendular:** Al provocarse el reflejo, en lugar de volver a su posición inicial de reposo, continúa oscilando como un péndulo.
- ◇ **Clonus:** Son una serie de contracciones involuntarias y rítmicas, originadas por la facilitación del reflejo miotático.
- ◇ Alteraciones del desarrollo muscular o trofismo.
- ◇ **Hipotrofia:** Es la disminución en el número de las fibras contráctiles, con disminución del volumen muscular.
- ◇ **Atrofia:** Es la pérdida de las fibras contráctiles y pérdida del volumen muscular. La palabra atrofia proviene del griego *atrophia*: falta de nutrición.
- ◇ **Seudohipertrofia:** Aparenta existir aumento de volumen muscular, un ejemplo es la pseudohipertrofia de Duchenne.
- ◇ **Hipertrofia verdadera:** Se puede presentar de manera fisiológica en pacientes que realizan actividad física, como los fisicoculturistas.
- ◇ Alteraciones del tono muscular.
- ◇ **Hipertonía:** Aumento del tono muscular.
- ◇ **Hipotonía:** Disminución del tono muscular.
- ◇ **Atonía:** Pérdida del tono muscular

Movimientos anormales.

- ◇ **Asterixis..** Movimiento involuntario súbito o como un aleteo, especialmente de las manos.
- ◇ **Convulsiones.** Afección por la que los músculos se contraen y relajan rápidamente, y causa temblores incontrolables del cuerpo
- ◇ **Mioclonías.** movimiento espasmódico rápido que no puedes controlar.
- ◇ **Temblores.** movimiento involuntario rítmico y oscilatorio que se produce por la contracción alternante de músculos agonistas y antagonistas
- ◇ **Tics.** espasmos, movimientos o sonidos repentinos que se hacen de manera repetitiva

### OTRAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE SISTEMA NERVIOSO.

- ◇ **Cefalalgia:** dolor que se percibe por encima del cuello, o bien toda sensación dolorosa que aparece en cualquier parte del cráneo, desde la nuca hasta la región orbitaria.
- ◇ **Vértigo.** sensación de movimiento o giros que a menudo se describe como mareo

### OTRAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS.

- ◇ **Diaforesis.** sudoración excesiva o abundante
- ◇ **Escalofrío.** Es la contracción repetida, más o menos intensa de los músculos, acompañada de vasoconstricción periférica, percibida como sensación de frío, piloerección y temblor, con dificultad para hablar,
- ◇ debido al castaño de los dientes
- ◇ **Fiebre.** Es la elevación de la temperatura corporal, por encima de las cifras consideradas como fisiológicas, debido a un reajuste del centro termorregulador a un nivel más alto (
- ◇ **Pirexia** Elevación de la temperatura corporal
- ◇ **Febrícula.** Fiebre inferior a 38°C

## **BIBLIOGRAFIA**

- ◇ Libro de semiología de las principales manifestaciones clínicas, de MC María del Carmen Aguilar Espindola octubre de 2020