



COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
UNIVERSIDAD DEL SURESTE
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA



PROPEDÉUTICO, SEMIOLOGÍA Y DIAGNOSTICO

ANDY JANETH PÉREZ DÍAZ

DRA. ARELY ALEJANDRA AGUILAR VELASCO

4 SEMESTRE

GRUPO D

4 PARCIAL

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS, A 25 DE ABRIL DEL 2024

DOLOR RENAL Y URETRAL

DOLOR RENAL

Capsula renal distendida por inflamación, infección, tumor u obstrucción crónica.

Comienzo insidioso, sordo, constante, intensidad moderada, localizado en fosa lumbar, sin irradiación a veces hacia el ombligo.

Inicio lumbar carácter cólico, irradiación a genitales, presencia de macro y microhematuria.

Dolor vesical:

Distensión aguda de la vejiga (deseo imperioso pero fallido de orinar).

A la palpación (globo vesical) de tamaño variable según tiempo de obstrucción.

Dolor prostático

Próstata inflamada

Dolor sordo perineal, irradiado hacia el recto, región retro y suprapúbica a veces acompañado de disuria.

COLICO URETRAL

Distensión aguda del sistema excretor renal: cálices, pelvis renal y uréter por encima de una obstrucción parcial o total.

Denominado cólico renal, nefrítico o uretral.

Comienzo insidioso, intensidad va aumentando hasta hacerse muy intenso.

Síntomas: náuseas, vómitos o distensión abdominal.

Duración variable (horas-días).

Causa: litiasis urinaria, coágulos, cristales, restos de papilas necróticas o cualquiera causa que produzca espasmo ureteropielico (obstrucción uretral aguda)

Localizado en fosa lumbar, hacia ángulo costo-vertebral o flanco del lado afectado irradiándose hacia flanco, región iliaca, hasta región inguinal interna o genital externa.

Fac. precipitantes: movimientos bruscos y repetidos

Hematuria (origen urinario del dolor)

