



**Universidad del sureste.**

Campus Comitán De Dominguez, Chiapas.

Medicina Humana.



## **Glosario de terminología médica y formato de historia clínica.**

**Nombre del alumno:**

Katia Marlen Espinosa Sánchez.

**Nombre del profesor:**

Dra. Rosvani Margine Morales Irecta.

**Parcial:** 1er. Parcial.

**Semestre:** 4to. Semestre. 4to. D

**Nombre de la Materia:**

Propedéutica, semiología y diagnóstico físico.

Viernes 15 de marzo del 2024.

## **Glosario de terminología medica por aparatos y sistemas.**

### **Sistema cardiovascular.**

- ∇ Acúfenos: Es la percepción de sonidos en ausencia de estímulos auditivos externos.
- ∇ Anasarca: Es una hinchazón general de todo el cuerpo que puede ocurrir cuando los tejidos del organismo retienen demasiado líquido.
- ∇ Ascitis: Es la presencia de líquido en el espacio peritoneal en íntimo contacto con sus dos hojas, visceral y parietal
- ∇ Cefalalgia: Dolor que se percibe por encima del cuello, o bien toda sensación dolorosa que aparece en cualquier parte del cráneo, desde la nuca hasta la región orbitaria.
- ∇ Cianosis: Es la coloración azul violácea, gris o púrpura de la piel y/o mucosas.
- ∇ Claudicación intermitente: Es un síndrome integrado por dolor, parestesias y/o impotencia motora, o mezcla de los tres fenómenos en uno o en ambos miembros pélvicos
- ∇ Disnea: sensación de dificultad para respirar en la que el paciente siente necesidad de aumentar el esfuerzo respiratorio
- ∇ Dolor precordial: Es la sensopercepción desagradable continua o paroxística localizada en la región precordial
- ∇ Edema: Es el aumento o exceso de líquido en el espacio intersticial y/o en las cavidades orgánicas, puede ser un exudado o un trasudado
- ∇ Espujo: Es el material biológico procedente de los pulmones, bronquio o tráquea (árbol respiratorio), expulsado por la boca a través del mecanismo de la tos o la expectoración.
- ∇ Expectoración: Es el acto de arrojar por la boca las flemas y secreciones que se depositan en la nariz, laringe, tráquea y bronquios
- ∇ Fosfenos: Son sensaciones luminosas en ausencia de estímulos externos.
- ∇ Frote pericárdico: Son ruidos cardiacos añadidos de tono alto, provocados por el frote de las hojas pericárdicas

- ▽ Galope: Es un ritmo en tres tiempos. Provocado por la presencia de un tercer ruido que se suma a los dos habituales
- ▽ Hemoptisis: Es la expulsión de sangre procedente de las vías respiratorias, siendo esta, roja, rutilante, fresca y espumosa o aireada.
- ▽ Ingurgitación venosa de la yugular: Es el aumento de volumen y consistencia de la vena yugular, por arriba de 4 centímetros de agua, debido a una acumulación de sangre
- ▽ Palpitaciones: Es una manifestación común en la que el paciente percibe el latido apexiano. Puede ser rápido, a veces lento, regular o irregular.
- ▽ Soplo: Son ruidos anómalos acústicos, que aparecen durante el ciclo cardiaco, debido a la presencia de flujo sanguíneo turbulento.
- ▽ Thrill: sensación percibida por la mano que palpa, o bien es la sensación táctil que produce la corriente sanguínea al pasar con cierta intensidad por los orificios valvulares.
- ▽ Tos: Es la expulsión espiratoria explosiva y ruidosa de aire procedente de las vías respiratorias.

### **Aparato digestivo.**

- ▽ Acedías: Es el eructo con sabor y olor a huevo podrido, pútrido, agrio, descompuesto y/o desabrido
- ▽ Acolia: Es la coloración blanca o de color arcilla de la materia fecal por ausencia de los pigmentos biliares.
- ▽ Hipocolia: Las heces presentan un color pálido por disminución de los pigmentos biliares.
- ▽ Hipercolia: Son las heces con una coloración café oscura, por aumento en la excreción de urobilinógenos y urobilinas fecales, como sucede en las ictericias de origen hemolítico
- ▽ Agruras: Es la sensación de agrio, de acidez, de ardor o dolor urente localizado en la orofaringe

- ▽ Anorexia: Trastorno de la alimentación, que se caracteriza por la ausencia de hambre, en presencia de la necesidad fisiológica de ingerir alimento
- ▽ Hiporexia: Es un trastorno alimentario caracterizado por la disminución del apetito
- ▽ Ascitis: Es la presencia de líquido en el espacio peritoneal en íntimo contacto con sus dos hojas, visceral y parietal
- ▽ Asterixis: es un temblor aleateante caracterizado por movimientos rápidos (frecuencia de 4 a 10 s), bruscos, irregulares, desordenados, bilaterales, de flexión y extensión en las articulaciones de la muñeca y metacarpofalángicas, existe pérdida del tono postural, con incapacidad para mantener la actitud.
- ▽ Borborigmos: Es la percepción de ruidos tintineantes como resultado de una perístasis hiperactiva, son sonidos procedentes del intestino, audibles por el paciente y a veces por el médico.
- ▽ Bruxismo: hábito para funcional durante los movimientos protrusivos y laterales de la mandíbula, sin propósitos funcionales de apretar y frotar y/o rechinar los dientes, se puede producir un ruido con el frotamiento y el hábito de apretar los dientes, puede ser de manera periódica y repetida, efectuando un movimiento rítmico y potente de trituración con clase piezas dentarias, puede ser diurno o nocturno y de manera inconsciente.
- ▽ Diarrea: presencia de tres o más evacuaciones que tengan disminución de la consistencia y aumento de la frecuencia.
- ▽ Disfagia: dificultad que se presenta durante la deglución y puede ser transitoria o permanente.
- ▽ Dolor abdominal: Es la sensopercepción desagradable localizada en el abdomen.
- ▽ Dolor ano rectal: Es la sensopercepción desagradable, localizada en la región anal, perianal, perineal y coccígea.
- ▽ Eructo: es la expulsión por la boca, por lo general de manera ruidosa, de gas proveniente del esófago y/o estómago.
- ▽ Estreñimiento o constipación: Es el retardo en la evacuación normal y periódica de las heces, siendo la defecación de poco volumen, infrecuente y/o molesta, las heces tienen una resequeidad excesiva y un volumen insuficiente.
- ▽ Flatulencia: Es la expulsión de gas por vía anal.

- ▽ Halitosis: Es el aliento con olor desagradable o mal olor del aliento.
- ▽ Hematemesis: Es el vómito de sangre proveniente del aparato digestivo, puede ir acompañado de jugo gástrico y/o restos alimentarios, la sangre puede ser roja o negra y no es espumosa.
- ▽ Incontinencia anal: pérdida del control voluntario de la defecación o bien la incapacidad para controlar la eliminación del contenido rectal, hasta que su expulsión sea socialmente aceptable.
- ▽ Melena: Es la expulsión de heces alquitranadas, de olor fétido, con aspecto untuoso, brillante, acompañadas de moco y son fétidas.
- ▽ Meteorismo: Es el aumento de la tensión o el volumen del abdomen por acumulación de gases en el intestino.
- ▽ Náusea: Se describe como una sensación vaga, desagradable y repulsiva que se experimenta en la región epigástrica.
- ▽ Odinofagia: Es el dolor que se presenta a la ingestión o deglución de los alimentos.
- ▽ Pirosis: Es la sensación de ardor o quemadura localizada en la región retroesternal o en la región epigástrica alta y en ocasiones puede ascender hasta la orofaringe.
- ▽ Prolapso rectal: descenso anormal de la mucosa del recto (incompleto) con salida o no a través del orificio anal.
- ▽ Prurito anal: Es la sensación de picazón o escozor que obliga al rascado de la región anal y área circundante
- ▽ Ptialismo: Es el aumento en la secreción de saliva por arriba de 1 500 ml.
- ▽ Sialorrea: escurrimiento de la saliva a través de las comisuras bucales, la lengua y los labios.
- ▽ Pujo rectal: es el dolor cólico rectosigmoideo que se origina en la fosa iliaca izquierda en sentido descendente hacia la región anal, con sensación de tenesmo rectal, por ausencia de contenido rectosigmoideo.
- ▽ Rectorragia: Es la presencia de sangre color rojo brillante (sangre fresca a través del ano, aislada o junto con las heces).

- ▽ Regurgitación: Es el regreso a la cavidad oral de pequeñas cantidades de contenido gástrico o esofágico por medio de movimientos antiperistálticos, sin acompañarse de náusea y arqueo.
- ▽ Tenesmo rectal: Es el impulso repetitivo e inefectivo de defecar o la incapacidad de la musculatura rectal de expulsar su contenido.
- ▽ Emesis: Es la expulsión del contenido gástrico a través de la cavidad oral de manera violenta.

### **Aparato respiratorio.**

- ▽ Aleteo nasal: Es la dilatación anómala de las narinas, puede ocurrir solo en la inspiración o la espiración o en todo el ciclo respiratorio e indica una disfunción respiratoria.
- ▽ Cianosis: Es la coloración azul violácea, gris o púrpura de la piel y/o mucosas.
- ▽ Disfonía: es la alteración de las propiedades acústicas de la voz.
- ▽ Afonía: pérdida de la voz.
- ▽ Disnea: sensación de dificultad para respirar en la que el paciente siente necesidad de aumentar el esfuerzo respiratorio.
- ▽ Dolor torácico: Es cualquier sensopercepción desagradable localizada en el tórax por encima del diafragma.
- ▽ Epistaxis: Es la salida de sangre proveniente de las fosas nasales, pero en algún momento dado puede ser expulsada por la boca.
- ▽ Estertores: Son ruidos anormales que se encuentran durante el ciclo respiratorio.
- ▽ Hemoptisis: Es la expulsión de sangre procedente de las vías respiratorias, siendo esta, roja, rutilante, fresca y espumosa o aireada.
- ▽ Obstrucción nasal: Es la dificultad para la entrada y salida de aire a través de las fosas nasales.
- ▽ Rinorrea: Es el flujo aumentado de origen nasal o salida de líquido por la fosa nasal.

- ∇ Tiros: Es la retracción de los tejidos blandos por el esfuerzo muscular, debido generalmente a una dificultad respiratoria para mantener un intercambio de gases compatible con la vida, es un signo de dificultad respiratoria.
- ∇ Tos: Es la expulsión espiratoria explosiva y ruidosa de aire procedente de las vías respiratorias.
- ∇ Vómica: Es la expulsión brusca y masiva por la boca e incluso por la nariz de una cantidad grande de pus o líquido, proveniente de vías respiratorias, se realiza a bocanadas con golpes violentos de tos, incluso puede haber asfixia.

### **Aparato urogenital.**

- ∇ Anuria: Es la ausencia absoluta de eliminación de orina sin presencia de orina en la vejiga
- ∇ Criptorquidia: Es la ausencia del testículo en su posición escrotal normal, aunque la gónada sea palpable y no esté oculta.
- ∇ Dispareunia: Es el dolor que se presenta durante el coito sin que exista obstáculo alguno que se oponga a su realización.
- ∇ Disuria: Es la micción desagradable, molesta y dolorosa o el dolor urente que se presenta durante la micción.
- ∇ Dolor prostático: Es la sensopercepción desagradable localizada en la próstata.
- ∇ Dolor testicular: Es la sensopercepción desagradable localizada en la región testicular.
- ∇ Dolor uretral: Es la sensopercepción desagradable localiza en la uretra y el meato uretral.
- ∇ Dolor vesical: Es la sensopercepción desagradable localizada en región hipogástrica.
- ∇ Edema: Es el aumento o exceso de líquido en el espacio intersticial y/o en las cavidades orgánicas, puede ser un exudado o un trasudado.
- ∇ Epispadias: Es la presencia del meato uretral en la cara dorsal o inferior del pene con incurvación fálica dorsal.

- ▽ Esguerrimiento uretral: Es la salida de secreciones patológicas a través de la uretra, por lo que se excluyen orina y semen.
- ▽ Fimosis: La fimosis es una condición en la cual no puede retraerse el prepucio de manera manual y lograr su descenso por detrás del surco balanoprepucial, sobre el glande
- ▽ Hematocele: Es la presencia de sangre dentro la túnica serosa vaginal.
- ▽ Hematuria: Es la eliminación de orina mezclada con sangre, situándose la lesión por encima del esfínter estriado de la uretra y encontrándose más de 3 hematíes en el sedimento urinario.
- ▽ Hidrocele: Es una colección de líquido entre la capa visceral y la capa parietal de la túnica vaginalis del escroto, de consistencia blanda o muy tensa y el líquido es claro o amarillo.
- ▽ Hipospadias: Alteración congénita, en la que el orificio uretral se localiza en
- ▽ la parte ventral del pene o en el periné, acompañado de una curvatura del eje mayor del pene en sentido ventral y la presencia del prepucio solo en la cara dorsal.
- ▽ Varicocele: Es la dilatación y tortuosidad de las venas del plexo pampiniforme del cordón espermático.

### **Sistema endocrino.**

- ▽ Ansiedad: Es una reacción subjetiva ante una amenaza real o imaginaria, caracterizada por una sensación inespecífica de desasosiego
- ▽ Astenia: Es la sensación de debilidad generalizada con fatiga fácil, laxitud y la falta o disminución de la fuerza muscular o energía, con el deseo intenso de permanecer acostado.
- ▽ Polidipsia: Es la sensación excesiva de sed
- ▽ Polifagia: Se define como hambre voraz o excesiva, aumento en la ingesta de alimentos, o sensación persistente de querer ingerir alimento.



- ▽ Poliuria: Es el aumento en la excreción de orina emitida en 24 horas, mayor de 2 a 3 litros.
- ▽ Somnolencia: Es la tendencia a quedarse dormido, propensión al sueño o la habilidad de transición de la vigilia al sueño, existiendo un gran deseo de dormir con dificultad para permanecer despierto en horas en que habitualmente no debiera suceder así.

### **Sistema músculo-esquelético.**

- ▽ Deformidad: Diferencia notable en la forma del cuerpo o parte del cuerpo, u órgano del cuerpo (interno o externo) comparada con la forma promedio de la parte en cuestión.
- ▽ Disfunción: Estado anormal de funcionamiento.
- ▽ Dolor: Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior.
- ▽ Equimosis: Moretón pequeño causado por la fuga de sangre de los vasos sanguíneos rotos en los tejidos de la piel o las membranas mucosas.

### **Sistema nervioso.**

#### **Alteraciones de la coordinación muscular.**

- ▽ Asinergia: Es la falta de cooperación muscular para efectuar movimientos voluntarios.
- ▽ Disdiadococinesia: Es la dificultad para realizar movimientos alternantes de pronación y supinación.
- ▽ Dismetría: Es la pérdida de la medida exacta en la ejecución de los movimientos.
- ▽ Pérdida del control de la musculatura antagonista: Los músculos que se oponen al movimiento de los músculos agonistas han perdido su función.

#### **Alteraciones de la movilidad.**

- ▽ Paresia: Grado de debilidad muscular leve a moderado.
- ▽ Monoparesia: Parálisis ligera (paresia) de un único miembro.
- ▽ Hemiparesia: Paresia que afecta solo a un lado del cuerpo.

### **Alteraciones de la sensibilidad.**

- ∇ Parestesia: Es una alteración de la sensibilidad, proviene del griego para: peor y aisthesis: sensibilidad, en la que el paciente refiere sentir pinchazos, sensación de frío o calor o bien adormecimiento, en ausencia de estímulo externo
- ∇ Hiperestesia: Aumento de la sensibilidad al tacto grueso, dolor y temperatura
- ∇ Hipoestesia: Disminución de la sensibilidad al tacto grueso, dolor y temperatura.
- ∇ Anestesia: Pérdida de la sensibilidad al tacto grueso, dolor y temperatura.
- ∇ Hiperalgesia: Aumento de la sensibilidad al dolor.
- ∇ Hipoalgesia: Disminución de la sensibilidad dolorosa.
- ∇ Analgesia: Pérdida de la sensibilidad al dolor.

### **Alteraciones de las funciones cerebrales superiores.**

- ∇ Afasia: Es la pérdida de la capacidad de expresión por medio de la palabra o la escritura y/o de la capacidad de comprensión del lenguaje hablado o escrito, debido a lesión o enfermedad de las áreas cerebrales que integran el lenguaje.
- ∇ Agnosia: dificultad o incapacidad de reconocer los estímulos presentados por vías aferentes cerebrales, en individuos que tengan preservadas la vigilia, conciencia, comprensión, funciones motoras y sensoriales.
- ∇ Alucinación: Son percepciones sensoriales falsas, cuya característica es que se presentan en ausencia de algún estímulo externo.
- ∇ Amnesia: pérdida de la memoria que puede ser parcial o total
- ∇ Apraxia: Incapacidad para efectuar actos, más o menos automáticos con una finalidad determinada, sin que sean atribuidos a paresia, ataxia, afasia y/o agnosia
- ∇ Hipoprosexia o euprosexia.: Es la disminución o pérdida de la atención.
- ∇ Hiperprosexia: Es el aumento patológico de la atención, caracterizado porqué el paciente pone su atención en varios objetos a la vez.

### **Alteraciones de los reflejos al estiramiento muscular.**

- ∇ Arreflexia: Es la abolición de los reflejos.
- ∇ Hiporreflexia.: Disminución de la respuesta de los reflejos.
- ∇ Hiperreflexia: Es aumento de la respuesta de los reflejos.

- ∇ Inversión del reflejo: Es la respuesta invertida del reflejo.
- ∇ Reflejos patológicos: Es la aparición de reflejos que normalmente no existen.
- ∇ Reflejo poliginético: En la hiperreflexia no se produce una sola sacudida como respuesta, sino varias sacudidas sucesivas.
- ∇ Difusión del reflejo o del estímulo: El reflejo se presenta estimulando más allá del sitio habitual para obtenerlo.
- ∇ Reflejo pendular: Al provocarse el reflejo, en lugar de volver a su posición inicial de reposo, continúa oscilando como un péndulo.
- ∇ Clonus: Son una serie de contracciones involuntarias y rítmicas, originadas por la facilitación del reflejo miotático.

### **Alteraciones del desarrollo muscular o trofismo.**

- ∇ Hipotrofia: Es la disminución en el número de las fibras contráctiles, con disminución del volumen muscular.
- ∇ Atrofia: Es la pérdida de las fibras contráctiles y pérdida del volumen muscular. La palabra atrofia proviene del griego atrophia: falta de nutrición.
- ∇ Seudohipertrofia: Aparenta existir aumento de volumen muscular, un ejemplo es la pseudohipertrofia de Duchenne.
- ∇ Hipertrofia verdadera: Se puede presentar de manera fisiológica en pacientes que realizan actividad física, como los fisicoculturistas.
- ∇ Alteraciones del tono muscular.
- ∇ Hipertonía: Aumento del tono muscular.
- ∇ Hipotonía: Disminución del tono muscular.
- ∇ Atonía: Pérdida del tono muscular

### **Movimientos anormales.**

- ∇ Asterixis: Movimiento involuntario súbito o como un aleteo, especialmente de las manos.
- ∇ Convulsiones: Son movimientos involuntarios caracterizados por espasmos clónicos (contracciones musculares y repetidas) de gran extensión e intensidad,

mientras que los movimientos tónicos son contracciones musculares de gran duración y sobrevienen por crisis.

- ∇ Temblores: Son movimientos oscilatorios rítmicos, regulares, de una parte, del cuerpo alrededor de un punto fijo.
- ∇ Tics: Son movimientos involuntarios anormales, rápidos, bruscos, estereotipados, repetitivos, limitados a uno o varios grupos musculares, que reproducen gestos de la vida diaria y pueden ser controlados de manera voluntaria.
- ∇ Cefalalgia: dolor que se percibe por encima del cuello, o bien toda sensación dolorosa que aparece en cualquier parte del cráneo, desde la nuca hasta la región orbitaria.
- ∇ Vértigo: Es la sensación de movimiento o desorientación en el espacio de tipo giratorio, ya sea que el paciente siente que gira o las cosas son las que tienen ese movimiento rotatorio, puede considerarse como una ilusión de movimiento.
- ∇ Vómito: Contenido gástrico es llevado de forma forzada hacia y fuera de la boca por contracción sostenida forzada de los músculos abdominales y diafragma.
- ∇ Diaforesis: Sudoración excesiva o abundante.
- ∇ Escalofrío: Sensación de frío, por lo común repentina, violenta y acompañada de contracciones musculares, que a veces precede a un ataque de fiebre.
- ∇ Fiebre: Es la elevación de la temperatura corporal, por encima de las cifras consideradas como fisiológicas, debido a un reajuste del centro termorregulador a un nivel más alto.

**Bibliografía:** libro de semiología de las principales manifestaciones clínicas, de MC María del Carmen Aguilar Espindola.



## Historia clínica.

### Identificación.

**Nombre(s):**

**Edad:**

**Fecha de nacimiento:**

**Sexo:**

**Nacionalidad:**

**Lugar de origen:**

**Residencia:**

**Idioma / lenguaje:**

**Religión:**

**Escolaridad:**

**Estado civil:**

**Etnia:**

**# teléfono:**

**Responsable / tutor:**

**Tipo de interrogatorio:**

**Fecha, hora de ingreso:**

**Egreso:**

**Antecedentes heredofamiliares.**

**Antecedentes no patológicos personales.**

**Antecedentes personales patológicos.**

**Antecedente gineco-obstétricos.**

**Interrogatorio por aparatos y sistemas.**

▽ **Sistema locomotor.**

▽ **Sistema nervioso.**

▽ **Sistema endocrino.**

▽ **Piel.**

▽ **Aparato respiratorio.**

▽ **Aparato cardiovascular.**

▽ **Aparato digestivo.**

▽ **Aparato urinario.**

▽ **Aparato genital.**