



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITAN DE DOMINGEZ
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

INFOGRAFIA : SIGNOS Y SÍNTOMAS URINARIOS.

MATERIA: SEMIOLOGIA

ALUMNA:DULCE MARIANA SANTIZ

BALLINAS

SEMESTRE4 TO " D"

NOMBRE DEL DOCENTE: DRA. AREL

ALEJANDRA AGUILAR VELASCO

SIGNOS Y SINTOMAS URINARIOS

DOLOR RENAL

ES UN SINTOMA POCO FRECUENTE, SOLO SE OBSERVA EN CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE DISTINGUEN LA CAPSULA RENAL, YA SEA POR INFLAMACION, INFECCION, TUMOR U OBSTRCCION CRONICA. ES UN DOLOR COMIENZO INSIDIOSO SORDO, CONSTANTE, DE MODEADA INTENSIDAD, LOCALIZADA EN LA FOSA LUMBAR DEL LADO COMPROMETIDO.

LA PUÑO-PERCUSION DE LA FOSA LUMBAR DEL LADO AFECTADO EXACERBA O)

COLICO URETRAL

SE DEBE A LA DISTENSION AGUDA DEL SISTEMA EXCRETOR RENAL: CALICES, PELVIS RENAL Y OBSTRUCCION PARCIAL O TOTAL DEL URETER. SE CARACTERIZA POR SER UN DOLOR DE COMIENZO INSIDIOSO, CUYA INTENSIDAD VA AUMENDADO HASTA HACERSE MUY INTENSO Y CASI INSOPORTABLE

DIAGNOSTICO :CLINICO

- INICIO LUMBAR Y DE CARACTER COLICO
- LAS FLATULENCIAS DE INTENSIDAD DURAN POR HORAS.
- IRRADACION A GENITALES Y LA PRESENCIA DE MARO O MIROHEMATURIA.

¿DOLOR VESICAL ?

DISTENSION AGUDA DE LA VEJIGA PRODUCE UN DOLOR MUY INTENSO HIPOGASTRICO, INICIALMENTE ACOMPAÑADO DE DESEO IMPERIOSO, PERO FALLIDO, DE ORINAR.

- EL PACIENTE PUEDE ORINAR POR REBOSAMIENTO ESCAPANDO PEQUEÑAS



- EL EXAMEN FISICO SE PERCUTIRA LA VEJIGA COMO UNA MATIDEZ DE CONVEXIDAD SUPERIOR, SUPRAPUBICA, U OCUPANDO TDO EL HIPOGASTRIO Y EN OBSTRCCIONES CRONICAS HASTA BAJO DEL OBLINGO.

PRINCIPALES SIGNOS Y SINTOMAS

DISURIA

malestar en la micción. Algunos autores usan el término disuria para referirse al dolor o ardor durante la micción.

POLAQUIURIA

micciones muy frecuentes y de escaso volumen, en casos severos, solo unas pocas gotas de orina cada pocos minuto.

DOLOR MICCIONAL

dolor al momento de la miccion puede acompañarse de ardor



URGENCIA MICCIONAL



Necesidad imperiosa e inaguantable de orinar sin que la vejiga esté llena. En oportunidades, se acompaña de vaciamiento involuntario de pequeñas cantidades de orina.



micción involuntaria, en niños mayores o adultos, durante el sueño.

normal en niños

ENURESIS

PUJO O TENESMO VESICAL

Ganas continúa o frecuente de orinar, con gran dificultad de lograrlo y acompañada de lograrlos.

INCONTINENCIA URINARIA

Es la micción involuntaria por incapacidad de retener la orina en la vejiga

OLIGURIA

- Es la disminución del volumen urinario por debajo de 400ml al día.

POLIURIA

- volumen urinario aumenta por encima de 3.000 ml/día. Se puede dividir en
- poliurias por acuosa u ósmotica.
- diuresis

ANURIA

- Se le denomina anuria al volumen urinario inferior a 100mL/ día y se reserva el nombre de anuria total a la ausencia total de orina.

NICTURIA

aumento del número de misiones durante las horas de sueño.. Normalmente durante el sueño disminuye la diuresis como de la mayor concentración de orina debida a la no ingesta de líquidos y no se siente deseos de orinar en parte por menor diuresis, control neurológico.



NICTURIA POR AUMENTO DEL VOLUMEN DE ORINA NOCTURNA

Insuficiencia cardiaca, síndrome nefrótico o cirrosis durante la noche, el paciente, estando en decúbito, reabsorbe, edemas y se frena la producción de renina aldosterona, aumentando el volumen urinario nocturno. Poliurias de cualquier origen, no es capaz de modular el volumen de orina

