





Mi Universidad

UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.
MEDICINA HUMANA



PLAN A, B Y C DE REHIDRATACIÓN ORAL

VIRGINIA GUADALUPE CABRERA MALDONADO

TERAPIA FARMACOLÓGICA

DR. DAGOBERTO SILVESTRE ESTEBAN

3° PARCIAL, 4° SEMESTRE "D"

VIERNES 31 DE MAYO DEL 2024.

PLAN DE REHIDRATACIÓN



	PLAN A	PLAN B	PLAN C
CLASIFICACIÓN	SIN DESHIDRATACIÓN	DESHIDRATACIÓN MODERADA	DESHIDRATACIÓN GRAVE / GRAVE CON SHOCK HIPOVOLÉMICO
SIGNOS Y SÍNTOMAS	<ul style="list-style-type: none"> • SED Y ORINA NORMAL. • ASPECTO DE ALERTA. • OJOS NORMALES. • BOCA Y LENGUA HÚMEDAS. • RESPIRACIÓN NORMAL. • ELASTICIDAD DE LA PIEL NORMAL. • FONTANELA NORMAL. • PULSO NORMAL. • LLENADO CAPILAR <2 SEG. 	<ul style="list-style-type: none"> • SED: + DE LO NORMAL. • ORINA: <CANTIDAD, OSCURA. • ASPECTO: IRRITADO/DECAÍDO • OJOS: HUNDIDOS. • BOCA Y LENGUA: SECAS. • RESPIRACIÓN: +DE LO NORMAL • ELASTICIDAD DE LA PIEL: SIGNO DE PLIEGUE + • FONTANELA: HUNDIDA. • PULSO: + DE LO NORMAL. • LLENADO CAPILAR: 3-5 SEG. 	<ul style="list-style-type: none"> • SED: EXCESIVA. • ORINA: NO ORINÓ EN 6 HRS. • ASPECTO: DEPRIMIDO/INCONSCIENTE. • OJOS: +HUNDIDOS/LLANTO SIN LÁGRIMAS • BOCA Y LENGUA: MUY SECAS. • RESPIRACIÓN: RÁPIDA/PROFUNDA. • ELASTICIDAD DE LA PIEL: SIGNO DE PLIEGUE >2 SEG. • FONTANELA: MUY HUNDIDA. • PULSO: FINO/NO PALPABLE. • LLENADO CAPILAR: >5 SEG.
TRATAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • + LÍQUIDOS. • NO SUSPENDER LACTANCIA. • CONTINUAR ALIMENTÁNDOLO. <p>DIARREA EMPEORA DAR SRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <2 AÑOS: 50-100 ML. • >2 AÑOS: 100-200 ML., DESPUÉS DE CADA EVACUACIÓN/VÓMITO. • CONTROL 24 HRS. 	<p>SRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50-100 ML/KG EN 4 HRS (8 DOSIS/30 MIN). • EVALUAR CADA HORA. <p>REEVALUAR SI EL PX. SIGUE DESHIDRATRADO O NO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PLAN DE 2 HRS + • PASAR PLAN A. • PASAR PLAN C. 	<p>ENVIAR AL HOSPITAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TOLERANCIA POR VO: COMENZAR HIDRAT. POR VO 20ML/KG/HR. • SIN TOLERANCIA POR VO: COLOCAR SNG CON SRO 20ML/KG/HR. • SI HAY SHOCK HIPOV.: COMENZAR EV CO SOLUCIÓN POLIELECTROLÍTICA 25 ML/KG/HR.



APUNTES DE CLASES.