



Nombre del alumno:

Katia Marlen Espinosa Sánchez.

Nombre del profesor:

Dr. Dagoberto Silvestre Esteban.

Parcial: 3er. Parcial.

Semestre: 4to. Semestre. 4to. D

Nombre de la Materia:

Terapéutica farmacológica.

Tema: Rehidratación oral.

*Deshidratación / Diarrea.*

<b>Plan A.</b>	<b>Plan B.</b>	<b>Plan C.</b>
Sed y orina normal.	Sed: más de lo normal. Orina: poca cantidad, oscura.	Sed: excesiva. Orina: no orinó durante 6 hrs.
Aspecto de alerta. Ojos normales. Boca y lengua húmedas. Respiración normal.	Aspecto: irritado / decaído. Ojos hundidos. Boca y lengua seca. Respiración más rápida de lo normal.	<b>Aspecto: deprimido o inconsciente.</b> Ojos muy hundidos, llanto sin lágrimas. Boca y lengua muy secas, sin saliva. Respiración muy rápida y profunda.
Fontanela normal. Pulso normal. Llenado capilar <2seg.	Fontanela hundida. Pulso más rápido de lo normal. Llenado capilar de 3-5 seg.	Fontanela muy hundida, (se palpa y se observa). <b>Pulso muy rápido, fino o no se palpa.</b> <b>Llenado capilar &gt;5seg.</b>
No hay deshidratación.	Si presenta 2 o más signos y síntomas tiene deshidratación.	Si presenta 2 o más de estos signos y síntomas tiene deshidratación grave. Si tiene 1 o más de los signos (con rojo) tiene deshidratación grave con shock hipovolémico.
Tx: Aplicar plan A para prevenir la deshidratación.	Tx: Aplicar plan B para tratar la deshidratación.	Tx: Plan C si el niño tolera VO, y no hay shock, comenzar por VO o por SNG.

		Comenzar EV: si hay shock, vómitos abundantes o más de 4 en una hora, si hay
--	--	--

## *Plan A.*

Recomendar:

- Dar más líquidos.
- No suspender la lactancia.
- Continuar alimentándolo.
- Higiene.

Si la diarrea empeora, dar SRO:

- <2 años: 50-100ml.
- >2 años: 100-200ml, después de cada evacuación.
- Control en 24hrs.
- Explicar signos de alarma.

## *Plan B.*

SRO:

- 50-100ml/kg en 4 hrs.
- Evaluar cada hora, hasta un máximo de 4hrs.

Revaluar:

Sin deshidratación:

- Plan A, en el domicilio.
- Comenzar con alimentación en el centro de salud.
- Control las 24hrs.

Si sigue la deshidratación:

- Continuar con plan B 2 hrs más.
- Revaluar: si se hidrató o no.

En caso de que no se haya hidratado derivar para plan C.

## *Plan C.*

Enviar al hospital.

- Colocar vía EV con solución polielectrolítica a 25 ml/kg/h, o solución fisiológica.
- Si tolera VO, comenzar hidratación por VO a 20ml/kg/h.
- Si no tolera VO, colocar SNG con SRO a 20ml/kg/h.

Bibliografía:

<https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000274cnt-s16-algoritmo-diarrea-irab.pdf>