



UNIVERSIDAD DEL SURESTE  
CAMPUS COMITAN  
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA



## Trabajo: Tabla Comparativa

**Pediatría**

**6to "A"**

**Alumno**

**Francisco miguel Gómez Mendez**

PASIÓN POR EDUCAR

**Catedrático:**

**Dr. Cristian Aguilar Ocampo**

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de abril de 2024.

*tabla pediatría*

	APNEA DEL PREMATURO	ENF. DE MEMBRANA HIALINA	TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RN	SX DE ASPIRACION DE MECONIO	DISPLACIA BRONCOPULMONAR
PRESENTACION	menores de 34 semanas de gestacion	·Recién nacidos menores de 28 semanas de gestación	cercanos a las 36 semanas de gestacion	frecuente en recién nacidos posttermino o termino . 42 semanas	< de 28 semanas de gestación.
DEFINICION	como la ausencia por 20 seg , periodica acompañada de bradicardia y disminucion en la saturacion de oxigeno o palidez y cianosis	· Dificultad respiratoria por incapacidad de producir liquido surfactante con colapso alveolar	proceso respiratorio no infeccioso que iniciara en las primeras horas de vida y se resuelve en 24 o 72 hrs	el feto sometido a estres en el cual evacua meconio , el cual si es aspirado provoca obstruccion mecanica	es una enfermedad pulmonar cronica que se diagnostica cuando el lactante necesita oxigeno suplementario mas 28 dias.
EPIDEMIOLOGIA	54 % de prematuros en edades gestacionales de 30 a 31 semanas de gestacion .	DSR se presentan en el 90% de los recién nacidos menores de 28 SDG	50% de insuficiencia respiratoria no infecciosa	10 al 15 % de embarazos solo el 5% de SAM	
CUADRO CLINICO	2 o 3 er día de vida pausas respiratorias de 20 seg. palidez , bradicardia , cianosis	Respiraciones con quejido Aleteo Nasal Pao2 <50mmh	cianosis respiracion rapida aleteo nasal o movimientos entre las costillas o el esternon conocidos como tiraje	ciansosis respiracion ruidosa . gruñidos . respiracion rapida	presencia de sibilancia presencia de estertores
DIAGNOSTICO	clinico . observacion de las respiraciones	Radiografico ; discreta opacidad, patron reticular , granular difuso , broncograma aereo. Aspirado gastrico Relacion lectina - esfingomelina	radiografia , rectificacion de arcos costales aplanamiento hemidiafragmatico , hiperclaridad y cisuritis corazon peludo	radiografia ecocardiografia pulsioximetria prueba de hiperoxia	clinica dias de uso de oxigeno
TRATAMIENTO	metilxantinas con impregnacion 20mg/kg/dosis. teofilina con 8 mg /kg/dosis i.v por 30 minutos	Manejo de Oxigeno Administracion de surfactante - Natural porcino. 200mg/kg(2.5ml/kg)	oxigeno a 88 -99% tecnica de alimentacion sonda orogastrica	ampicilina + gentamicina . 2da liena cefotaxima ( amikacina )	uso de corticoides antenatales manejo de oxigeno
FR	<34 sdg alteraciones metabolicas neurologicos , farmacos , ERGE.	prematurez , asfisia perinatal . edad gestacional . sexo masculino , segundo gemelo	asma , t rruptura macrosomia , hombre		20 dias