

**Nombre de alumno:
Paola Isabel Díaz Sánchez**

**Nombre del profesor:
Cristian Jonathan Aguilar Ocampo**

**Nombre del trabajo:
infografía ENC**

Materia: pediatría

Grado: 6 grupo: A


Introducción

Es la enfermedad de urgencia digestiva mas común en los recién nacidos, es muy común ya que es adquirida, es la cual provoca la necrosis en las capas más profundas del intestino, tiene diferentes signos y síntomas que hacen que se sospeche de esta enfermedad ya que suelen tener una gran intolerancia alimenticia, tienen problemas en sus niveles térmicos, también hay presencia de distensión, vómitos biliosos y la presencia de hamatoquesia, todo esto se debe a que el intestino del bebe `pues no está totalmente maduro provocando una lesión isquémica anterior desarrollando lo que es la enterocolitis necrosante, mientras el bebe sea alimentado con leche materna este no sufre pero cuando es alimentado enteral es cuando hay una gran proliferación de bacterias, las cuales se pegan a las paredes del intestino provocando la causa de padecer enterocolitis necrosante.

enterocolitis necrosante

definición

Es un síndrome de lesión intestinal y la urgencia intestinal más frecuente en los neonatos pretérmino



epidemiología

Aparece en 1-4 por cada 1.000 nacidos vivos

La enfermedad aparece en el 12% de los lactantes con un peso al nacer inferior a 1.500 g

etiología y patogenia

es multifactorial la cual es E coli patogénica.

- Inmadurez intestinal
- Alteración de la microbiota
- Alimentación enteral e isquemia



CLÍNICA




signpos clinicos precoz

- distensión abdominal
- intolerancia a la alimentación/incremento de los residuos gástricos
- Vómitos
- hemorragia rectal y diarrea ocasional.

signos en la enfermedad

- letargo
- inestabilidad térmica
- incremento de episodios de apnea/bradicardia,
- coagulación intravascular diseminada y shock



dx y tx

clínico, paraclínico y radiológico y tx:

Ampicilina 50 mg/kg/día, IV, c/8 h
Amikacina a dosis de 10 mg/kg/día, IV, c/24 h
Metronidazol 15 mg/kg/día, IV, c/12 h
Gentamicina

Referencias

colorado, u. d. (s.f.). manual MDS. Obtenido de manual MDS.
<https://www.msmanuals.com/es-mx/professional/pediatr%C3%ADa/trastornos-gastrointestinales-en-reci%C3%A9n-nacidos-y-lactantes/enterocolitis-necrosante>

Conclusión.

Al ser un bebé prematuro sufre mucho más que un niño determinado ya que aún sus órganos y el no están listos para tener una vida plena sin complicaciones, también un factor importante que ayuda a combatir lo que es la necrosis necrosante es la lactancia materna ya que llena de lactobacilos al intestino, provocando que la flora intestinal sea una barrera que combata lo que es los microorganismos que provocan esta patología, también se debe de tener una buena atención a estos bebés ya que pues es la patología más frecuente y que se tiene que tratar de manera urgente para los recién nacidos ya que pues aún no están maduros, los métodos para el diagnóstico se debe de realizar rápido ya que pues conforme pase más tiempo esto empeora la enfermedad.

(colorado, s.f.)

Bibliografía

colorado, u. d. (s.f.). *manual MDS*. Obtenido de manual MDS: <https://www.msdmanuals.com/es-mx/professional/pediatr%C3%ADa/trastornos-gastrointestinales-en-reci%C3%A9n-nacidos-y-lactantes/enterocolitis-necrosante>