



Nombre del alumno:

Cesar Enrique Utrilla Dominguez

**Nombre del profesor: Dr. Aguilar
Ocampo Cristian Jonathan**

Infografía (OMA)

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Grado: 6°

Grupo: A

**Comitán de Domínguez Chiapas a 19 de
mayo del 2024**

Introducción

En el presente trabajo que se trata de una infografía se dará a conocer a cerca del tema de otitis media aguda o abreviado OMA, que se presentara en pacientes pediátricos, los cuales son los que tiene más frecuencia/afectación por esta patología, dado a que aun no han desarrollado o no tiene un buen sistema defensivo para los distintos patógenos que estan presentes en la vida cotidiana, asi como los factores de riesgo que se deben de tomar en cuenta para que se desarrolle, los diagnósticos a utilizar o que se van a emplear para tener una correcta valoración, asi como de equipo que se puede llegar a utilizar em el momento de la exploración dado que en un bebé no tiene la capacidad de expresarse de manera directa, el tratamiento a utilizar conforme a lo que se presente y que este tenga una recuperación adecuada sin causar más daño o que simplemente el tratamiento que se lio no le sea de ayuda.

otitis media aguda

OMA



¿Qué es?

presencia de inflamación en el oído medio acompañada de inicio súbito de signos y síntomas de inflamación del oído medio: fiebre, irritabilidad, anorexia, otalgia y vomito. niños menores de 5 años representa del 50 a 90% de otitis media




cuadro clínico

menor a 48 horas
OTALGIA
HIPOACUSIA
signo de trago (-)

diagnostico

1era elección: otoscopia neumática
inflamación de membrana timpánica
movilidad de la membrana timpánica limitada o ausente
nivel hidroaéreo de la membrana timpánica
otorrea



factores de riesgo

menor de 2 años
ausencia de lactancia (o menor de 3 meses)
asistencia a guarderías
convivencia con niño enfermo de las vías respiratorias
USO DE CHUPON
uso de biberones
exposición a humo de cigarro
presencia de alérgenos
ausencia de vacuna anti neumococo

tratamiento

manejo del dolor o ibuprofeno 10 - 15 mg/kg/dosis
amoxicilina-acido clavulánico 80 - 90 mg/kg/día en 3 dosis
NO SE RECOMIENDA EL USO DE GOTAS OTICAS, MUCOLITICOS O ANTIHISTAMINICOS.
el tx para menores de 6 años: 5 - 10 días
El Tx para mayores de 6 años: 5 - 7 días



pronostico

px con categoría de alto riesgo para complicaciones:

- menores de 2 meses
- episodio de OMA en menores de 6 meses
- asistencia a guardería
- inmunocomprometidos



Referencias

(S/f). Gob.mx. Recuperado el 19 de mayo de 2024, de <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/496GRR.pdf> GPC de otitis media aguda (OMA)

Conclusión

Con la infografía anterior se espera que sea de ayuda, para llevar a cabo un entendimiento acerca del tema explicado, la utilización de los diagnósticos necesarios, el uso de algún equipo para llevar a cabo la exploración del canal auditivo, en quienes se puede llegar a presentar, el cuadro clínico que se llegará a presentar dado que son algunas de sus características que se llegan a manifestar, los tratamientos que se usaran en el momento para llevar a cabo una recuperación adecuada y eficaz para no causar aun mas daño o que no llegara a servir el tratamiento y solo se prolongue mas la afectación, y los pronósticos que se llegara a manejar para aquellos pacientes pediátricos que lo ameriten y se deba de llevara cabo.

bibliografia

S/f). Gob.mx. Recuperado el 19 de mayo de 2024, de <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/496GRR.pdf> GPC de otitis media aguda (OMA)