



Licenciatura en Medicina Humana  
Campus Comitán.



**Tema:**  
**Infografía OMA**

**Nombre de la alumna:**  
**Paola Isabel Díaz Sánchez**

**Materia:**  
**Enfermedades infecciosas**

**Grado: 6 grupo: A**

**Nombre del docente:**  
**Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo**

## Introducción:

La otitis media Aguda es conocida como la inflamación del oído medio provocando una gran pérdida de audición y más que nada la sensación de dolor y molestia que les produce a los niños, hay factores predisponentes a esta enfermedad como por ejemplo, el uso de chupón, la exposición al humo de tabaco, la ausencia de las vacunas anti.neumococo, cuando los niños asisten a las guarderías se vuelve como un ciclo ya que hay niños que se contagian estando con otro que tenga esta enfermedad, ya que es de carácter viral, que es la s.pseudomona que es una de las que siempre están presentes en la vida diaria de todos los seres humanos, esta también si no se trata de la manera correcta puede producir lo que es un derrame de líquido que es expulsado en el oído provocando mucho más dolor y sordera, en el cual pues muchas veces ya son tratamientos quirúrgicos según como lo vea el médico tratante, o bien iniciar con el cuadro de antibióticos por unos 5 a 10 días hasta , bajar la sintomatología que se presenta ya en esta situación.

# OMA

## definicion

presencia de inflamacion en el oido medio acompaña de inicio subitico de signos y sintomas de inflamacion de oido medio.



1)

## epidemiologia

niños menores de 5 años representan el 50 y 90 % 27 corresponde a OMA y 1 73 a OMD



2)

## etiologia

es de origen bacteriana, esta sucede mas de 2 veces al año por las condiciones anatomicas de la trompa de Eustaquio e inmadurez del sistema inmune.



3)

## factor de riesgo

menor de 2 años asistencia en guardería, ausencia de lactancia, uso de chupón, exposicion de humo de cigarro, ausencia de vacuna anti-neumococo.



4)

## clinica

otalgia principalmente fiebre hipoacusia signo de trago -



5)

## tratamiento

paracetamol o ibuprofeno de 10-15 mg/kg/dosis Amoxicilina en casos graves.



6)

## referencia

castellanos, d. f. (s.f.). guia de practica clinica otitis media externa .  
Obtenido de guia de practica clinica otitis media externa:  
<https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/438GER.pdf>

## Conclusión:

Esta es una enfermedad de carácter bacteriana en la cual se debe de actuar de manera rápida ya que si no es detectada en tiempo esta empeora afectando mas a la población que está cerca de uno los más afectados son los infantes que son llevados a la guardería por lo que se hace un ciclo vicioso, los síntomas que son de mayor demanda en esta enfermedad es la fiebre, la otalgia y la hipoacusia, también en casos extremos estos llevan a lo que es la perforación del tímpano. Uno de los tratamientos antiinflamatorios y los de alivio de dolor son paracetamol y el ibuprofeno que se da por unos 5 días para la mejoría de estos síntomas y molestias que se llevan a cabo en esta enfermedad.

(castellanos, s.f.)

## Bibliografía

castellanos, d. f. (s.f.). *guia de practica clinica otitis media externa* . Obtenido de guia de practica clinica otitis media externa:  
<https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/438GER.pdf>