



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITAN
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA



Infografía Otitis Media Aguda

Enfermedades infecciosas.

6to "A"

Alumno

Francisco miguel Gómez Mendez

PASIÓN POR EDUCAR

Catedrático:

Dr. Cristian Aguilar Ocampo

Comitán de Domínguez Chiapas a 22 de mayo de 2024.

Introducción

La otitis media aguda es una patología infecciosa del oído medio muy frecuente . El diagnóstico es clínico, por lo que es fundamental un acucioso examen físico y una neumotoscopia para evaluar la movilidad timpánica.

La Otitis media serosa (OMS) es un estado patológico del oído medio, caracterizado por la presencia de un líquido generalmente seromucoso, ocupando la caja timpánica y mastoides . Existen 3 formas de otitis media serosa: – Aguda: Menos de 3 semanas de evolución. Característica de un cuadro catarral.

La otitis media aguda es una enfermedad infecto-contagiosa aguda que afecta al aparato respiratorio, cuyo síntoma típico es un tos en accesos o paroxismos. Aproximadamente el 70% de los niños han tenido algún episodio de otitis media .

OTITIS MEDIA AGUADA



OTITIS MEDIA AGUADA

La OMA es la inflamacion de oido medio de inicio subitico se caracteriza por presencia de liquido en la cavidad del oido medio y se asocia con signos y sintomas de inflamacion local .

ETIOLOGIA

Virus : VSR , para influenza .
Bacterias : S. pneumoniae , H. Influenzae , M catarrahls



EPIDEMIOLOGIA

Incidencia en pediatricos .
Recomendacion de la vacuna contra Neumococo, H .
Influenzae tipo B e influenzae.
Bacteriana : s.Pneumoniae

FACTORES DE RIESGO

- No modificables
- Edad
- Genero masculino
- origen etnico
- Guarderia
- Nacimiento prematuro
- inmunodeficiencias



FACTORES DE RIESGO

- Modificables
- Acudir a guarderias
- Tipo de alimentacion (falta de lactancia leche materna)
- Exposicion al humo del tabaco
- uso de pacificadores (chupones y biberones)
- obesidad

DIAGNOSTICO

Otoscopia simple : MT hiperemica y abombada con o sin otorrea .
Otoscopia Neumatica : MT hipomovil



CLÍNICA

Otalgia , irritabilidad , fiebre e hipoacusia

TRATAMIENTO

- Amoxicilina VO
- Amoxicilina - Clavulanico
- Cefuroxemia o Ceftriaxona

Conclusión

la otitis media es una causa frecuente de ingresos hospitalarios, y se identifican como principales factores de riesgo la asistencia a círculos infantiles y el tabaquismo de algunos de los padres.

La otitis es una afección del oído. Se trata de la daño de alguno de los tejidos del oído ; dependiendo de la parte del oído que esté afectada existen dos tipos de otitis; son la otitis externa y la otitis media, ésta puede ser aguda o crónica.