

**Universidad Del Sureste
Campus Comitán
Medicina Humana**

**Alumno: Alex Peña Xochitiotzi
Grado: 6° Grupo "B"**

"Resúmenes de unidad"

Profe: Dr. Roberto Javier Ruiz

Ginecología

Comitán de Domínguez Chiapas a 5 días de julio del 2024

Cáncer de endometrio

• Clasificación de la FIGO

Estadío	Criterio
IA	Tumor limitado a endometrio
IB	Tumor que invade $\leq 50\%$ del Míometrio
IC	Tumor que invade $> 50\%$ del miometrio
IIA	Extensión de glándulas endocervicales
IIB	invasión al estroma cervical
IIIA	Extensión a serosa uterina y/o anexos
IIIB	Mitostasis a vagina, parametra y/o peritoneo pélvico
IIIC	Mitostasis a ganglios linfáticos Pelvicos o Paraaorticos
IVA	Extensión a la mucosa y/o Mucosa rectal
IVB	Mitostasis a distancia, incluyendo Ganglios intraabdominales y/o inguinales.

• Clasificación Bi-RADS

0	Valoración incompleta	Se praxen estudios adicionales
1	normal	
2	Hallazgo Benigno	Control habitual
3	Probablemente benigno (VPP $< 2\%$)	Seguimiento a corto plazo ⁶⁻¹²⁻²⁴ meses
4	Suspición malignidad (2-95%)	Biopsia
5	Altamente sospecha de malignidad ($> 95\%$)	
6	Malignidad confirmada histológicamente	Tratamiento

Score 1: Aumento de masa ovárica (Masa extraovaria)

Hallazgo patológico en mujeres perimenopáusicas: Foliculo 3CM, quiste hemorrágico $\leq 3\text{cm}$ o cuerpo lúteo $\leq 3\text{cm}$

Score 2: Quiste univulvar simple

- Quiste univulvar anelométrico
- Unión con quista sin tejido sólido salvo núcleo Pockelansky
- Unión sólida Dark-Dark
- Heteromorfismo
- Quiste parovario
- Lesión quística - Masa sólida Dark-Dark

Score 3

- Quiste univulvar - polivulvar, hemorrágico o mucinoso
- Quiste multivulvar de cualquier tipo
- Unión con tejido sólido que muestra signos de captación de bajo rango (tipo 1)
- Proliferación ***
- Heteromorfismo *
- Lesión quística
- Tejido sólido con áreas de bajo rango

Score 4: Cualquier lesión con heteromorfismo y centros de captación de rango intermedio (T.2)

- Si no hay evidencia durante captación del hueso sólido o sea al momento de la 30-40s
- Unión con gran parte con tejido sólido (No sólido)
- Componente sólido de áreas de rango intermedio

Enunciado 5

- Cualquier lesión con lesión rotunda y cuneo de caput de alto veyo alto (Tipo 3)
- Si no hay estudio de tamaño copda del tejido rotunda mayor al tamaño a los 30-40s
- Comminución fractura
- Comminución rotunda con cuneo de alto veyo
 - Comminución.