



**Rojas Velázquez Joan Natael**

**Ruiz Ballinas Roberto Javier**

**Escalas**

**Ginecología**

**6°B**

Comitán de Domínguez Chiapas a 05 de julio de 2024

# BI-RADS

Estadio 0: Cáncer de mama in situ es decir, está confinado a los lóbulos o conductos de la mama.

Estadio I: El tumor es pequeño e invasivo. Puede o no haberse propagado a los ganglios linfáticos cercanos a la mama.

Estadio II: El cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos axilares o cercanos a la clavícula. Puede haber o no tumor en la mama.

Estadio III: (A) El cáncer se ha propagado a 4 a 9 ganglios axilares o cercanos a la mama clavícula, pero no al resto del cuerpo.

(B) El tumor se ha propagado a la pared torácica o la piel de la mama provocando una úlcera o hinchazón.

(C) Cáncer de cualquier tamaño que se ha propagado al menos 10 ganglios axilares, a la piel de la mama o la pared mamaria.

Estadio IV: El cáncer es metastásico. Lo que significa que se ha propagado a otros ganglios o órganos como huesos, pulmones, cerebro o hígado.



# O-RADS

O-RADS MRI Categoría	Categoría del riesgo	Valor predictivo	Descripción de la terminología
0	Evaluación incompleta	N/A	N/A
1	Ovarios Normales	NA	<p>Sin lesiones ováricas</p> <p>Foliculo definido como un quiste simple <math>\leq 3</math> cm</p> <p>Quiste hemorrágico <math>\leq 3</math> cm en una mujer pre-menopáusica</p> <p>Cuerpo lúteo +/- hemorragia <math>\leq 3</math> cm en una hemorragia</p>
2	Probablemente benignas	20.5%	<p>Quiste: unilocular-cualquier tipo de contenido líquido</p> <p>Quiste: unilocular-contenido de líquido simple e endometrioso</p> <p>Lesión con contenido graso</p> <p>Lesión con contenido sólido</p> <p>T<sub>2</sub> oscuro / DWI oscuro</p> <p>Trompia de falopio dilatada</p> <p>contenido líquido simple</p> <p>Quiste para-ovárico, con cualquier tipo de fluido</p>
3	Bajo riesgo	5%	<p>Quiste: contenido de líquido unilocular, protico, hemorrágico o mucinoso</p>



			<p>Quiste: multilocular - cualquier tipo de líquido, sin contenido de lípidos</p> <p>Lesión con tejido sólido</p> <p>Trompa de Falopio dilatada</p>
4	Riesgo intermedio	50%	<p>Lesión tejido sólido excluyendo T2 oscuro/BW1 oscuro</p> <p>Lesión con contenido graso</p>
5	Alto Riesgo	90%	<p>Lesión con tejido sólido excluyendo T2 oscuro/BW1 oscuro.</p> <p>cerca de intensidad de tiempo de alto riesgo en resonancia magnética.</p> <p>Nódulos peritoneales, mesentericos, o mental o engrosamiento irregular de peritoneo con o sin ascitis.</p>



# FIGO

- IA Tumor limitado al endometrio
- IB Tumor que invade  $\leq 50\%$  del miometrio
- IC Tumor que invade  $>50\%$  del miometrio
- IIA Extensión a Glándulas endocervicales
- IIB Invasión al estroma cervical
- IIIA Extensión serosa uterina y/o anexos
- IIIB Metástasis a vagina, parametrios y/o peritoneo pélvico
- IIIC Metástasis a ganglios linfáticos pélvicos o paraaórticos
- IVA Extensión a mucosa vesical y/o Mucosa rectal
- IVB Metástasis a distancia, incluyendo ganglios intraabdominales y/o inguinales.