



**Universidad del sureste**

**Campus Comitán**

**Licenciatura en Medicina Humana**

**Tema: escalas de clasificación de neoplasias**

**Nombre del alumno: Alinne Pérez Velasco**

**Grupo: "B"**

**Grado: sexto semestre**

**Materia: Ginecología y obstetricia**

**Nombre del profesor: Roberto Ruiz Gordillo**

Comitán de Domínguez Chiapas a 02 de julio de 2024

## Clasificación de BI-RADS

Bi-RADS 0	<b>Estudio insuficiente</b> , requiere una evaluación adicional
Bi-RADS 1	<b>Mamografía negativa</b> , sin hallazgos imagenológicos que reportar
Bi-RADS 2	<b>Hallazgos benignos</b>
Bi-RADS 3	<b>Hallazgos probablemente benignos</b> <2% de riesgo de malignidad (nódulos sólidos no calcificados, asimetría glandular, microcalcificaciones puntiformes, iguales, agrupadas)
Bi-RADS 4	<b>Hallazgos con sospecha de malignidad</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BIRADS 4 A: baja (2-10%)</li><li>• BIRADS 4 B: moderada (10-50%)</li><li>• BIRADS 4 C: alta (50-95%)</li></ul>
Bi-RADS 5	<b>Alta sospecha de malignidad (&gt;95%)</b>
Bi-RADS 6	<b>Malignidad demostrada histológicamente</b>

## CLASIFICACION FIGO

Estadio	Extensión	Supervivencia
I	Cáncer limitado a los ovarios	80
Ia	Limitado a un ovario, capsula intacta, sin tumor en superficie ovárica, sin ascitis.	90
Ilb	Tumor en varios ovarios, capsula intacta, sin tumor en superficie ovárica sin ascitis	82
Ilc	Ia o Ib con cualquiera de los siguientes: rotura capsular, tumor en superficie ovárica, células malignas en ascitis o lavado peritoneal	76
II	Tumor que compromete uno o ambos ovarios con extensión pélvica	63
Ila	Extensión o implantes a útero o trompas, o ambos	66
Ilb	Extensión a otros órganos pélvicos	63
IIlc	Ila o Ilb con células malignas en ascitis o lavado peritoneal	62

### Clasificación de O-RADS

SCORE 1	SCORE 2	SCORE 3	SCORE 4	SCORE 5
<p>Ausencia de masa ovárica/ masa extraovarica</p> <p>Hallazgo fisiológico en mujeres premenopáusicas: folículos &lt; 3cm, quiste hemorrágico &lt;=3cm o cuerpo lúteo &lt;= 3cm</p>	<p>Quiste unilocular simple</p> <p>Quiste unilocular endometrioso</p> <p>Lesión con grasa sin tejido solido salvo nódulo de Rockitansky</p> <p>Lesión solida dark-dark</p> <p>Hidrosalpinx</p> <p>Quiste paraovarico</p>	<p>Quiste unilocular proteinaceo, hemorragico o mucinoso</p> <p>Quiste multilocular de cualquier tipo</p> <p>Lesión con tejido solido que muestre curva de captación de bajo riesgo (tipo 1)</p> <p>Piosalpinx</p> <p>Hematosalpinx</p>	<p>Cualquier lesión con tejido solido y curva de captación de riesgo intermedio (tipo 2)</p> <p>Si no hay estudio dinámico captación de tejido solido menor al miometrio a los 30-40s</p> <p>Lesion con grasa per con tejido solido (no rockitansky)</p>	<p>Cualquier lesion con tejido solido y curva de captacion de alto riesgo alta (tipo 3)</p> <p>Si no hay estudio dinamico captacion de tejido solido mayor al miometrio de 30-40s</p> <p>Carcinomatosis peritoneal</p>
	<p>Lesiones quísticas</p> <p>Masa solida dark-dark</p>	<p>Lesiones quísticas</p> <p>Tejido solido con curva de bajo riesgo</p>	<p>Componente solido con curva de riesgo intermedio</p>	<p>Componente solido con curva de alto riesgo</p> <p>carcinomatosis</p>